

正豐露

WUCHSAL

性收吸力強有均部根到面葉由

菇洋菇洋菇洋菇洋菇洋菇洋菇洋
 育發的菇洋進促能露豐正
 傘開不實結傘菇使能露豐正
 量重的粒菇洋加增能露豐正
 間期獲收長延・苗菇壯健能露豐正
 力抗抵的害蟲病強增能露豐正
 生發的害病防預能露豐正
 稻水稻水稻水稻水稻水稻水
 育發進促並害霜苗秧止防
 病萎黃止防能露豐正
 上以20%成收加增能露豐正

正豐化學股份有限公司



爲了農作物，請用正豐露！

免撥草・好收成

水稻除草請用！

最安全
最有效的強力水田殺草劑



多谷



一分地一期作只用一次3公斤

項事意注	持保水田	期適藥施	作工備準
1. 施藥前田水應積一五公分，(按土壤種類予增減水深)。 2. 施藥後應保持土不浮出水面。 3. 施藥三天後缺水，可徐徐補充不足水分。 4. 下雨時應留有葉面高之排水口，以防稻株被浸過而影響藥部發育。	1. 避免施藥層被破壞再生雜草，施藥後12天內勿下田工作。 2. 軟弱秧苗積水勿超過藥舌，以免藥害之虞。 3. 晨露或雨後葉面未乾易引起藥害，應俟乾燥後施用。 4. 無水田或漏水嚴重田，一次灌水不能保持二天以上，則應改用思登或除草劑。	1. 第一期作整地完成日起六十八天。 2. 第二期作整地完成日起三十五天。	1. 柳樹畦畔之漏洞，減免施藥後灌漑水之流失。 2. 整地力求平坦以保持同一水深。 3. 應施用基肥以促進水稻初期生育。 4. 施藥前應先檢除田面雜草。

ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA

PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA

台灣總代理：青象貿易有限公司

現貨供應處：

正豐化學股份有限公司

總公司：台中縣霧峰鄉民生路200號 電話：63-163-174

嘉義分公司：嘉義市信義路196巷2弄8號 電話：5554

屏東分公司：屏東市重慶路84號 電話：2289

*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標



信用可靠
的標記