

(二) 菇舍構造

菇舍構造可密閉，菇舍內牆壁要光滑不留空隙，地面宜為水泥或汰石灰地，門窗裝設尼龍紗網(○·○·二公厘孔) 出入口加設重門。

(三) 菇舍消毒

於密閉塑膠菇舍，堆肥上床前一至二周，菇舍清掃後，以福馬林加高錳酸鉀的方法燻蒸消毒。通常五十載培坪密閉式塑膠菇舍，用七〇〇〇福馬林液(三五%) 加上三五〇公克高錳酸鉀，使其發生福馬林氣體消毒菇舍，將門窗關閉一天後打開，並起動送風機，排出福馬林氣體。

(四) 堆肥處理

堆肥經室外堆積，上床後在菇舍

(五) 土壤消毒

內以攝氏五五度至六五度溫度處理十五小時以上(以上處理稱為後發酵)，即可殺死大部分有害病菌。後發酵時下層溫度較低，害虫將往下移動，可事先向菇舍地面噴射五〇%「二氣松」乳劑三、〇〇〇倍稀釋液。

一般土壤中潛伏有許多病菌及害虫，必須事先加以消毒。土壤消毒方法，一種為福馬林五〇倍稀釋液，均勻注入覆土材料中，注入後蓋上塑膠布。經二十四小時後撤去塑膠布，將土壤散開七天左右，使福馬林氣體消失後使用。

另一種為蒸氣消毒，將蒸氣管通入使用覆土內，以攝氏七十度溫度處理五小時左右。此時處理土壤厚度不可太厚，以免發生不均勻現象。

(六) 栽培期中的防治

洋菇栽培期中，工作人員出入菇舍，必須隨時關緊門戶，以免瘦蚋成虫的飛入。預備室內門窗紗網處瘦蚋成虫容易集中的地方，應每隔一天噴射五〇%「二氣松」乳劑三、〇〇〇倍稀釋液一次。

如發現有白色瘦蚋及黃色瘦蚋幼虫時，即可灌注四至四〇%「除虫菊精乳劑」二、〇〇〇倍稀釋液一次，連續八至十次，每坪使用一至一·五公升，可配合洒水施藥。

以上數點為瘦蚋的防治方法，但主要還是要靠操作人員的管理。因本省位在亞熱帶，頗適合瘦蚋的繁殖，在菇舍周圍象多飛虫環境下，要辦理防虫工作並非易事，栽培者應經常注意防虫。

採收洋菇，切除基脚(唐少銘)


日本「エルト」安而得農機

歡迎來信要求
實地表演


祝各位農友 新春發財，春節快樂。

唯一採取防振裝置之引擎刈草機

TE-22



往覆式動力採茶機



高級電動刈草機每小時只用電二度半，
只須二元五角；重量世界最輕。


FC-4



迴轉式動力採茶機



本省銷售最多的MK-5 割草機



沒有電之地方，有此

EPG-800

EPG-600



台灣總代理：晏德實業股份有限公司

台北市中山北路一段105巷13之8號
TEL. 513426