

•球·根·植·物•

水仙

一係成一



黎 民 敬

連接的頸部能出芽發育，如大麗花。

鱗莖類可用分離子球及球體

直接繁殖。塊莖類可由切割繁殖，每一块狀肉質上，最少須有一芽眼方可。根莖類可由自然分球而分離出的球體分株繁殖。塊根類可用地上部枝梢扦插，或塊根帶頂芽切割繁殖之。

各種球根類，除用以上諸營養體作繁殖材料外，均可用種子實生法培育，但因成長太慢，採種、保種不易，除育種等特殊目的外，甚少採用。

球根植物羣中有的種類，必

需冷涼氣候的刺激生長，才能充分發育開花，這就

不適合在本省平地栽培，如風信子、鬱金香、綿竹兒、番紅花等。

這裡介紹的十幾種球根植物，都是適合本省氣候，多數可留在地中多年不必掘起，仍然生長良好，繁殖力強盛的種類。

〔葱蘭・蕙蘭〕

葱蘭 (*Zephyranthes candida*, Herb.) 原產

西印度，又名海水仙。葉劍狀厚有褶凹於中央，花白色萼片深裂細長，基部由雄蕊花絲連生，成膜似杯形，株形茂密寬大，宜單植。花成繖形排列，着生於梗端，輕盈有姿。耐高濕，可植於池沼及河溝邊緣。層狀鱗莖可分球繁殖。

四 海芋

海芋 (*Zantedeschia aethiopica*, Spreng.) 原產南印度洋及大西洋兩岸，秀麗雅緻的白色苞片，與中央特出的花蕊柱，金黃交映，成為世界有名的觀賞植物。海芋地下部為根莖，年年可行增殖分球。花期在春夏季，約有半年之久，海芋依母球的大小，決定開花期的先後，花後有短期的休眠。地上部枯萎後如遇雨季，兩三年內不必掘起球根，保持良好發育。

海芋除

露地栽培外

育。

菖蒲

的根莖類：球體本身無芽眼，僅在上方與莖基

仙等，球體外層均包有一層棕皮。如無外層的棕皮，鱗片裸露而排列較鬆如蓮座狀者，叫做盤狀鱗莖

球根植物按地下肥大組織形態分為五大羣：

(1) 層狀鱗莖類：如葱蘭、夜來香、孤挺花、水

仙等，球體外層均包有一層棕皮。如無外層的棕皮

，鱗片裸露而排列較鬆如蓮座狀者，叫做盤狀鱗莖

球根植物按地下肥大組織形態分為五大羣：

(2) 球莖類：球上常有環狀節痕，如小蒼蘭、唐

菖蒲。

(3) 塊莖類：如彩葉芋等。

(4) 塊根類：球體本身無芽眼，僅在上方與莖基

，有單瓣及重瓣種。種植株距以一尺左右為宜。每兩年掘起分球一次，否則莖葉繁茂而花數漸少。

分離小球可得多數新株，一年後即可成壯健的

開花株。

晚香玉芳香濃郁，可植於屋子南面，作花壇材

料，或切花插於室內。嘉義地區有大量經濟栽培，

李世禧農友並自設香料廠抽提香精。此花性好陽光

但也能耐高濕，秋植的生長良好。

三 世蟹百合

世蟹百合 (*Hymenocallis speciosa* L.) 原

產西印度，又名白菖蒲蓮。葉片為管狀中空，花白色，

株形細小，適於叢植或屋基、小徑傍列植。性好陽

光，在蔭處種植的花數較少。除嚴冬外周年開花。

如不逐年分株，子球就成簇繼續團聚成長。對土質


的要求不苛。

菲蘭 (*Z. grandiflora*, Lindl.) 原產中美洲

，又名紅菖蒲蓮。葉片平展如帶狀，花深粉紅色，

株形略大於葱蘭，葉基近地面處具赤褐色。栽培習

性如葱蘭。



世蟹百合

如何保全鄉村樸素與自然之美

陳瑞源

隨着社會結構的改變，都市人口日漸集中，生活空間也相對的減少了。都市生活的嘈雜與緊張，使得人們渴望戶外活動，要求有更多的機會去接近大自然。

有人提出「都市鄉村化」與「鄉村都市化」的口号。这也提醒了我们，在美化农村的同时，要注意到乡村风景美的保全。

與自然。美化農村，必須重視這一觀念，保全現存的鄉村美。建設鄉村的計畫，要從各個不同的角度，來共同完成。

鄉村美化最主要的是要保持鄉土特有的風格。例如鄉土原生樹種的多加應用，田地的美化和古跡的保存，使得每一座農村、漁村、塙村或山城，各有其特色。

構造、顏色、坐落與屋宇間的調和，才美觀。色彩的使用應較樸素。鮮艷的顏色，有時會破壞鄉村的平靜感覺，但如色彩的調和與對比，配得宜，不流於庸俗，反可形成鄉土風光的特色。造園並無成法，要因時因地制宜得體。

環境零亂與廢物廢水的處理不善，影响公共衛生，大殺風景。垃圾堆要遠離住宅，畜舍要保持清潔，廢物與農藥切不可傾入溪流，汙染水源。

廣告招貼與宣傳海報，不可在牆壁或電線桿上隨意張貼，破壞美觀。要當作藝術品來處理，安為安排布置。

農友如果遇到一些實際的問題，非常歡迎來信。本刊研究各



(五)
百合




三


百合(Lilium Spp.)原種多分布於北半球的暖帶地區，本省的鐵砲百合(L. Longiflorum, Thunb.)、唐子百合(L. Speciosum, Thunb.)、高砂百合(L. Formosanum, Wallace)都是聞名世界的原種。歐美各國常用鐵砲百合，為復活節代表性花卉，除花壇栽種外，尚可供盆栽觀賞，及切花經濟栽培。

百合的子球及鱗片均可順利繁殖。如培育良好，一年即可成開花球。經過雜交育種改良，現有品種很多，如橙色及紅色雜交系的透百合、姬百合、以及山丹等。栽培期中，需要時常鬆土，並作地表覆蓋。

火球花 (*Haemanthus Coccineus*, L.) 產
產南非，葉闊大而有明顯葉脈。花密生，聚成球形



文殊蘭



彩葉芋



小蒼蘭

美洲及亞洲，大型花被顏色鮮艷，有紅、橙、黃以至白色品種。花形不規則，是由雄蕊瓣化所成。本省各地分布普遍，適於任何土質，能耐不良環境。

花期長，株形、葉形都很美觀，可用作花床的背景植物。在不規則地形布置庭園，局部使用，有特殊美化效果。成叢栽植，經多年始須進行分株移栽。除冬季外，隨時可行切分，每根莖上最少應留有兩枚芽眼。

(十一) 美人蕉

蘭，本省有原生種，各地常可發見野生狀態的文殊

花白色芳香，種植於屋宇四周，春、夏夜晚，處處飄香。繖形聚生花序，花數約二〇枚成叢，花苞片深裂稍向下反捲。株型壯大，為多年生鱗莖類球根植物。頸部膨大部分常露出土壤表面。能忍受不良環境，花期漫長，是庭院布置的優良材料。種植距離應在三尺以上。

蘭草 (*Hemerocallis fulva*, L.) 俗稱金針菜，中國及歐洲原產。花被桔黃色，含苞待放時可採取鮮食或晒乾食用。品種頗多，歐美多作庭園栽培。叢生性，多年不須分植。台大曾引入十餘品種，花大、肉質肥厚的，試栽於溫室圃地，增殖迅速。

(八) 文殊蘭

的苞片，花數約有五〇枚左右。顏色紅艷誘人，花後結成紅色漿果，也有觀賞價值。栽培火球花要有豐富的有機質，入冬有短暫休眠期。本省平地生長良好，並可逐年增殖春季開花。

(七) 薑草

薑草 (*Hemerocallis fulva*, L.) 又名文殊

蘭，本省有原生種，各地常可發見野生狀態的文殊

鳥尾，南非原產。球莖性狀有點像唐菖蒲，有厚硬棕皮。

花株本身細小纖弱，一梗多花，頂端橫向水平延伸。花由基部陸續上開，花色自純白至黃粉紅及紫色，花姿優美。本省會有經濟栽培，但因種球的收掘，休眠及病害控制問題，未能澈底解決，還需繼續研究。栽種期應在八月以後，日照較短的季



大球花



鳥芋

(十) 彩葉芋

彩葉芋 (*Caladium Bicolor*, Vent.) 及烏芋 (*Alocasia Spp.*)，都是大南星科觀葉植物，為熱帶美洲及亞洲原產的塊莖球根類。彩葉芋的葉色、葉脈色調及葉片盾形多變化，廣為庭園栽作及盆植所採用。成簇栽種時，色彩斑斕，有美麗奪目的效果。分球繁殖迅速，宜植於稍有遮蔭之處，以免盛夏受強烈日光傷害。