


——理想的室內盆栽花——

非洲堇



——林進益——

園藝家們，一直在尋求一種適合於室內生長，能够四季開花，花色又是十分鮮艷的植物，以適應現代都市住宅的要求。這種盆栽花卉，終於在第二次世界大戰前後發現了。那就是生長在東非洲森林中的非洲堇 (African violets 學名: Saintpaulia ionantha)。

非洲堇原先只有單純的藍色，且僅是單瓣的花朵。後來，經過美國園藝家們多年的改良育種，已有重瓣種及其他的色彩出現，現在已有近二百個品種了。

在美國，多數人家有冷暖氣設備，室內的溫度調節，一般保持在攝氏二〇度左右。非洲堇的生育適溫，正好是攝氏二〇度，因此很快地受到人們的歡迎。目前在美國，幾乎家家戶戶都栽培非洲堇。它的銷路，占所有盆栽花卉的第一位。

士林園藝試驗所在五、六年前，引進了十三個品種，並積極推廣，目前在本省已有二〇餘品種，市面上已開始普遍可以買到，每盆零售價在二〇至三〇元之間。生長良好的品種，可賣到五十元。

非洲堇的原種，其花瓣大多是單瓣的，經過改良後，已有半重瓣及重瓣等品種，且葉片帶有白斑的也不少。照花色來分，主要品種有：白色種、藍色種、粉紅種及斑葉種等。

栽培環境：非洲堇的生育適溫，是攝氏二〇度。越冬最低溫度是攝氏一〇度；在夏季，最高溫可到攝氏三二度。它原是生長在岩石的隙縫中，所以所需的濕度要高。

非洲堇性喜散光，直射日光或強光會侵害它的葉片，有關光度與非洲堇的生育，花芽形成的關係，根據試驗結果：三〇〇英尺/燭光以上時，即可花芽分化，否則就會惡化。適當的光度為八〇〇至一、〇〇〇英尺/燭光。

如果把非洲堇栽培在玻璃窗邊沿，或一百燭光燈泡下二公尺以內，生長和開花，均十分良好。

繁殖方法：非洲堇的繁殖，主要是葉插和分株兩種。葉插應帶葉柄，可將它插在砂箱內，或玻璃杯內，盛水三分之一，三分之二露空。或藥瓶內(藥瓶盛水三分之二，葉柄插入水中，葉片露出瓶外)。

葉插後，兩周可發芽發根，一個月後，可長出數株至十數株新莖芽。定植時，可將其分開成數株，加以栽培。

經常自國外引進的葉片，經葉插後，雖發芽發根完成，母葉也不致枯黃，為經濟利用，可將葉芽上的葉柄切斷，連續再葉插一、二回，仍有發芽發根的能力。

非洲堇的繁殖，除葉插外，也可採分株繁殖。買回來的非洲堇，可以將其從盆中倒出，依其莖芽的多少，一芽芽分割，立刻定植在盆內，每盆可分成數盆。

非洲堇盆栽用的培養土，需事先調製完成。如果有舊菊花土，可以倒出應用。如新調製培養土，可混合粘土、腐植土及砂(或可以蛇木細屑代替)，按二：一：一的比例調製。

上盆時，先將瓦片覆蓋排水孔，再將粗培養土置於盆鉢底部，細培養土置於盆鉢上部。分株苗或扦插苗，按原來深度，種在盆內，不可過深。栽植後應輕輕鎮壓

。培養土不要沾污到葉面上，可以減少腐爛之虞。栽植後，即需澆水。一般盆栽非洲堇，選用的盆鉢是直徑三寸至五寸。

灌溉：非洲堇需要較高的溫度，室內的空氣溫度往往較低，一定要靠灌溉來補救。春秋每隔一天澆水一次，夏季每天澆水一次，冬季則每三至五天澆水一次。澆水時，最好用水壺沿盆緣輕輕澆注，避免用噴水壺直接撒到葉片上，因非洲堇葉片帶有絨毛，沾水後易於腐爛。

施肥：非洲堇的自然分蘗良好，每一株莖芽都能開數朵花，一年四季不斷分蘗，不斷開花，盆栽的培養土，應隨時加施追肥。

肥料可選用台灣肥料公司出品的「花卉肥料」，每兩星期施用一次，每盆每次施用三分之一到二分之一大匙，肥料施在盆鉢邊緣。如果日久培養土減少了，可順便填加培養土。葉片不可沾到肥料，否則會腐敗。

病虫防治：非洲堇的病害，有日燒病和腐爛病二種。在直射日照下，容易發生日燒病；在水珠及肥料沾污葉片，和澆水過多，培養土排水不良時，容易發生腐爛病。

主要的害虫有粉介壳虫，吸吮葉液，應用八〇〇倍「馬拉松」乳劑，每隔三天噴洒一次，連續二至三次可收效。

玻璃杯葉插繁殖

