

中華民國六年二月十六日

月後，其中一個患急性白血球過多症，九天之後，即告死亡。同時另一位開始感覺容易疲勞，經常發冷發熱。

三個月以後，症狀益形劇烈，送入醫院治療，診斷結果，也患白血球過多症，同樣無法避免死亡。

一位強健的美國農人曾經用DDT和BHC噴撒大約六十英畝土地。噴霧由風吹送，紛紛落在他身上。當天晚上，他覺得異常疲乏。

此後幾天，有虛弱感覺、

頭痛、腿痛和感冒，必須臥床休息。此後症狀日形惡化。在噴藥後一周，進醫院治療。發高燒，血球計算不正常，病後兩個半月，死於醫院。

還有一位醫師，公餘熱心照料他的花園，經常對灌木和草坪噴藥，每周一次。開始時使用DDT，後來改用馬拉松。有時使用手提噴霧器，有時使用水管上的裝置，常使他的皮膚及衣服被噴霧浸濕。

大約一年以後，他突然昏倒，送入醫院。經過切片檢查

P的DDT，使神經廣泛的受到損傷。此後他日形消瘦，極度疲乏。並有一種獨特的肌肉虛弱症狀，這是馬拉松特有的作用。使得他此後，不能再從事任何的工作。

像這類不幸的故事，正在不斷的演出，是一幕極長的現代悲劇。

我們殺除家庭害蟲時，先要考慮到自身的安全。(仲立)

每年施用八百斤石灰波爾多液二至三次，

可以盆栽的樹木，有松、柏、杉、榕樹、樟木、楓香、黃楊、檉柳和竹類。這些樹木可被人工播種或天然下種的實生苗，也可以採取天然生的幼木。

掘取樹苗時期以元月前後為宜。落葉小喬木或楓樹、樟木等種木不帶宿土。掘取時勿損傷側根，主根過長者應予剪短，剪除枯萎枝條。常綠喬木或貴重樹種如松、柏等，掘取時應帶宿土以保護根部。掘

取高大灌木如榕樹、櫟木、楓香等，應於秋末切斷根莖，在大寒前後伐除樹幹，只留樹頭高約二〇公分，掘取後並加修剪。

栽植時選大小適度的磁盆，以瓦片或碎石覆蓋盆底排水孔，先放三分厚的砂石或木炭，再用粘土壤充半盆。然後用左手持苗直立，右手取篩過的培養土填覆壓緊，疊高中央部分再輕壓即成。栽植後立刻用細孔壺噴水，放在蔭涼處，發芽後再移於固定地點。

栽植後應不斷灌水，保持盆土濕潤，促進為十全十美的盆景。

盆栽樹木

曾仁添

生根發芽。灌水時間以早晨或傍晚最好，每日灌水一至二次。

最簡易肥料以黃豆餅浸十倍清水，經過二十小時後，除去豆粕施用溶液，以免招引馬蟻食害樹芽。施肥次數每年至少三次，分別於春末、秋初、冬末施用，多施豆餅水有益無害。


發生雜草時隨時除去。

每年施用八百斤石灰波爾多液二至三次，可防病害。防治切根虫、夜盜虫或馬蠍，可用BHC粉劑散播盆內。

或用魚藤精八百倍液噴洒，忌用劇毒性農藥。

盆栽樹木長大後，剪除枯枝及無用枝條，稱美觀。剪枝時剪口應位於芽之上方。

強勢直立的徒長枝先端，加以適當的彎曲，使其脫離直立方向。曲枝可以抑制強勢徒長枝條的發展，矯正弱枝適度發育，控制養分流通及發芽之效。細心管理，久而久之，自然成



盆景