

農業生產



茭白筍栽培

王進生

(一)茭白筍栽培及管理要點如下：
①土壤以灌溉方便，且含有豐富的有機質壤土為宜。土壤反應以（酸鹼度）五·五—五·六的微酸性土壤較理想。

②南部栽植適期為一—三月。

③栽培十公畝所需苗床面積約二公畝。苗床用平畦，選取優良植株，宿根移植於苗床。

育苗時氣候如寒冷，應設防風寒風壩（用稻草苗床地點宜設在日照充足的場所）。

經常保持水深一—二公分，育苗期間約四十天。育苗期間可用豬糞尿追肥一—二次，或施用硫酸銨一—二次，促進植株的生長。

④栽植行距一公尺，株距八十公分。十公畝地的栽植數約一二〇〇株。

⑤適宜的苗株，株高約四十公分左右，過長過高的苗株，應剪除一部分的葉，然後栽植，以免栽植後因風吹倒伏。每植穴只栽一苗，栽植深度約六公分。

⑥施肥量（十公畝）：
堆肥一五〇〇—一八〇〇公斤。

過磷酸鈣六十公斤作基肥，追肥分為四次。

第一次—硫酸銨

十八—二十公斤

第二次—硫酸銨

三十一—三十二公斤

第三次—硫酸銨

三十一—三十五公斤

氯化鉀

十一—十二公斤

第四次—硫酸銨

三六—四十四公斤

氯化鉀

六一—八公斤

(一)本省茭白筍的品種，計有青壳、巨壳、赤壳

三種。其中白壳的產量較高，為中期生產的優良品種。彰化、員林有苗株，請直接向上述農會代找農家，然後向農家分讓，每株價格約一·五—二角。
(二)台南縣較少出售苗株。（王進生）

椰子栽培

康玉湖

(一)椰子樹：矮種者為早熟種，四—五年結實，樹齡約四—五〇年，果實較多，但果肉較薄。

高品種者為晚熟種，七—八年結實，樹齡約七〇—八〇年，果實較矮種為少，但果肉較厚。

本省在來種，是光復前由東南亞各地陸續引進，品種複雜。馬來亞種是光復後由農復會、林務局補助各縣政府引進者。此外尚有引進少數泰國種，均屬良種。

據近年來各縣政府育苗統計報告，以馬來亞種最好，發芽率達七〇—八〇%，泰國種及在來種發芽率為四〇—五〇%。

(二)馬來亞種，目前嘉義、台南、高雄、屏東各縣政府，均有引進育苗供應推廣。據聞高雄市左營東門路九十九號吉祥企業公司，有少數馬來亞種椰苗出售。在來種，以屏東縣最多，可洽屏東市椰種商採購。

(三)椰子用途：目前本省尚須向國外進口大量椰油、椰乾、椰肉、椰渣、及椰製品，今後本省若大量生產椰子，可自供自給，減少外匯支出，並可將所產原料及各種加工品外銷，爭取外匯。

椰樹為長期性作物，栽培省工，成本低廉，用途甚廣，經濟價值高，推廣前途良好。

(四)椰苗定植，應在春季或雨期前，定植一、二年的椰樹。

在旱季應加灌溉，雨季期宜注意排水，避免長期浸水，此外也應注意病蟲害防治及施肥。

有關椰子選種、育苗、栽培、管理、經濟價值、加工利用等資料，請參閱「豐年」二十卷五期植樹造林特輯，及二十卷六期「可可椰子簡介」。

台南縣玉井鄉竹園村十九之五號鄭國昌農友，來函問椰子栽培問題，請參考。

柑桔根接

翁仁祿

有關柑桔根接問題，簡要說明如下：
(一)柑桔根接，除炎熱夏天及嚴冬以外均可實施，但成活率仍以立春前後（二月至四月間）為高。方法如下：

(1)將根砧於根部附近，用利刀斜削。

(2)用根接刀或芽接刀，按根砧切口的大小，在柑桔接穗部下端凸出部（主枝直下）作U形切口（深僅至木質部）。

(3)用鐵釘釘緊接木部（由接穗部皮上），用麻綿縛緊根砧。

(4)種植新根砧，必須埋土（如左圖，覆蓋至接木部）。

(一)罩蒙枝條的再生力強，壓條或扦插均可使發根，但壓條苗或扦插苗均缺直根，樹命短，經濟價值低。

(二)柚砧罩蒙，由於罩蒙本身的導管粗大，數量疏少，與極柑、桶柑或一般甜橙類等栽培品種間的親和性不良，不適改接。

如果一定想淘汰罩蒙，更換其他品種時，請認斷舊砧木（柚子）部，改接柚子類（文旦、柚子均可），如無法

鋸至舊砧木時

，留小段罩蒙

部亦可，但中間砧木不宜留

過長（越短越好）。

台中縣和平鄉自由村陳

貴農友來函問

有關柑桔根接問題，請參

考。

