

好延至八月下旬或九月月上旬才種。此時適為雨季末期，豪雨少，萌芽若能整齊，分蘗與母莖可一同生長，便無徒長之虞，也可以減少將來倒伏的損失。

施用足量肥料

肥料可促進早期分蘗，矯正F一六〇原有分蘗不太整齊的缺點。而早期的分蘗又常是組成原料莖的有效分蘗，所以，要想獲得九萬支原料莖，就應該注意培育早期的分蘗，將來才可豐收。

因此，F一六〇的基肥宜較重，追肥時期亦應酌予提早，而且肥料用量必須充足，以減少分蘗的死亡。

放寬行距株距

本品種屬中大莖，如果蔗園管理得好，分蘗數亦多，照目前一二五公分的行距，和三十公分的株距，似乎稍嫌不足，以致在地力較好的蔗園，通氣不足，一旦倒伏後，彼此壓抑，枯死莖聚增，顯出它母本NCO三〇的基本弱點——表面上一片油綠蔗葉，但覆蓋在青葉下面的，却是大把的枯稿。

此種情形，在契約蔗園尤為普遍，希望蔗友們多多注意。最好將行距放寬至一三七公分或一五〇公分，株距放寬至四十公分，以減少枯死莖，確保豐收。

注意適期入土

在勞力不缺乏時，當分蘗數日達到一定量後，須注意入土，以加大壟

壟頭和防止倒伏。

本品種在一般地力的蔗園，極不易倒伏，但收成好的年分，尤其是肥沃地區，倒伏更甚。此一情形，今年隨處可見，注意適期入土，也不失為防止倒伏的一種方法。

剝除枯乾葉片

F一六〇農藝性狀很像NCO三一〇，枯葉不易自動脫落，加上去年沒有颱風，枯葉尤多。目前採收時，就發現園中枯葉太多，虫害發生，在基部常可找到螟虫洞孔，剖視內部，紅肉一連數節，糖分甚低，損失頗大。若能在甘蔗生長旺盛季節，剝除枯葉一、二次，不僅可減少虫害，尚且可大量減少枯死莖。

置放殺鼠藥劑

今年蔗園中，老鼠洞特多，甘蔗基部和中部被啃食者，比比皆是，被啃斷者已成枯稿，半斷者亦生勢萎凋，品質變劣。因此，成長蔗須置放殺鼠靈以毒殺。

控制土壤水分

本省甘蔗成熟的條件是低溫乾燥，欲獲得較好的糖分，應控制土壤水分，亦即後期灌溉要適當，以免延長成長熟期。如遇大雨，更要立刻設法排水。

上述幾點，栽植時如能做好，再加上注意防治病害工作，必能有好的收成。白葉病及葉枯病多的地區，應避免栽種本品種，或採行春植。

MP 21.2 粒劑

含有兩種成份！
具有最佳效果！
水田用除草劑！

最新
水田用
除草劑

原裝進口

MP 將為您帶來無限希望
您從此再不必為除草工資而打算盤了



特点： 稗草、貓毛草、藟草(塩酸仔)等
及二年生雜草均可一掃而淨

大日本インキ化学工業株式会社 製造

台灣三笠化學工業股份有限公司 台灣總經銷



彰化市大竹莊145号 TEL.2633