養猪用牧草有那幾種？

——台東區農業改良場 蔣悅

利用牧草養猪，經本場（台東區農業改良場）試驗結果，顯示用牧草養猪可節省濃厚飼料二〇至三〇%，即可節省不少飼料費用。

牧草是生長快，容易栽培的多年生飼料作物，因此，能全年不斷的供應青飼料，且可使猪健康，肉質堅實。使毛猪比飼餵甘藷葉莖或其他青飼料者，更易獲得較高價格。

養猪用牧草，必須選擇莖葉較嫩且葉色濃綠，營養豐富者。玆將幾種養猪用牧草及栽培法簡介如下：

㈠狼尾草

多年生禾本科牧草。

種植時期：三至七月。

種植方法：扦插或分株繁殖，行距八〇公分，株距三〇公分。

施肥量：每公頃每年硫酸錏五〇〇公斤，過磷酸鈣三〇〇公斤，氯化鉀一〇〇至一五〇台斤，以磷鉀肥的全量與氮肥全量的四分之一於種植時施於植溝內，與土壤混合後種植，其餘氮肥在第二次、第四次、第六次青割後施下（每次施用氮肥量四分之一）。

利用方法：草高達一公尺時即可開始利用。牧草養猪，必須選擇莖葉較嫩，且色澤濃綠，營養豐富，猪的嗜食性高者，亦即生長良好，莖葉較嫩的青草。

由田間刈取，在餵飼濃厚飼料前直接投進猪舍內的清潔地面上，給猪任意咀食，不須切斷，也不需混合濃厚飼料。

因猪是單胃動物，消化能力比牛羊等反芻家畜差，因此，不可像牛羊一樣全部將渣滓吃下去，否則會因纖維過多，影响猪的發育。

㈡南非鴿草

是叢性多年生草本，適應地區爲全省海拔一、五〇〇公尺以下地區。

種植時期：三至七月。

種植方法：

通常以成熟的莖切成二至三節扦插或分株繁殖，行距六十公分，株距三十公分。

施肥量及利用方法：與狼尾草相同。

㈢營多藤

是爲蔓性不攀緣的多年生豆科牧草，適應地區爲本省海拔一、〇〇〇公尺以下的地區均可種植，但土質以輕鬆土爲佳，如栽培在砂土粘重土壤或河川地上生育均不良。

種植時期：三至五月。

栽培方法：

營多藤可用播種或扦插法繁殖，本品種的硬籽性不强，種植前最好不須浸種，先播在苗床上，等到株高三十公分時移植田間。

目前本場都用枝條扦插，成活率很高，且容易生長。

每穴插植二至三枝，插植用枝條長約三十公分（其稍部和星半直立性的枝條不宜用，因組織幼嫩或過老成活率低），株距三十至六十公分，行距六十至一〇〇公分。

施肥量：在種植前每公頃施用硫酸錏十公斤，過磷酸鈣三〇〇台斤，氯化鉀一〇〇至一五〇公斤，施於植溝內作基肥。第二年後每年在雨季前每公頃施用過磷酸鈣三〇〇公斤，氯化鉀一五〇公斤，如生長不佳可以少量尿素在陰天作葉面撒播，以促進發生枝條。

利用方法：

在營多藤生育旺盛覆蓋全面後，可開始刈取約五十公分長的嫩枝連同葉片，作爲猪、牛、羊、雞、火雞、兎等的青飼料，也可供果樹園下的覆蓋綠肥作物。

利用營多藤養猪時，約以五十公分長未變色嫩枝連同葉片由田間刈取，在給與濃厚飼料前直接投進猪舍內的清潔地面上，給猪任意咀食，或用切草機切細，然後可混合濃厚飼料餵飼。

插植及分株繁殖法

扦插以切成二至三節，像種甘藷莖一樣，基部二節插入土中，上部一節或二節露出地面。

分株繁殖法爲定植時六或七支爲一單株。



餵種公猪飼料