

農友經驗



八公斤，三年生三公斤，四年生三·五公斤，自二月至十一月，分六次平均施用。

六十年全省農事、家政推廣表彰年會，於二月十六、十七兩天在省農會舉行年會中，並舉行農事經驗發表及家政方法示範表演。

冠軍是雲林縣張輝元農友，題目是我栽培軟枝大型楊桃經驗。

農業多角化經營

軟枝大型楊桃

張農友說：他於民國五六年開始種植楊桃，面積〇·一二公頃，栽植六〇株，選擇優良品種，每株距離為一五×一五公尺，每穴挖四五公分寬深的洞穴，施下腐植堆肥六公斤與土壤拌勻。

栽培方法：

設立棚架：可防颱風損害果實及便於採收，設立平頂式棚架。

整枝與修剪：採用杯狀形整枝法，將各分枝導成六〇度向四方平均伸展，形成圓錐形中心空虛後，使日光通風良好，提高結果率，並經常剪除弱小及病虫害枝。

灌排水設備：每年乾燥季節，酌量灌溉，但雨期須注意排水良好。

施肥：每年二月間酌量施下堆肥外，其餘採用柑桔用複合肥料，每株施用量如下：
一年生〇·六公斤，二年生一·

病虫害防治：楊桃病虫害很少，有時發生毛虫、捲葉虫及果實斑點病，發生時噴「賽文」五〇〇倍及「大生二二」六〇〇倍防治。

疏果：結果後發現有畸形或被虫害果粒應立即摘果，或樣生果實酌情疏果，以提高商品價值。

套袋：果粒六分成熟時，套上塑膠袋，防止果蠅及鳥加害。

收穫與運銷：

楊桃種植後，滿二年即可開始收穫，一年中有八個月開花結實與收穫。採收熟度，視楊桃果實肥滿、光澤及呈顯黃色即可採收。當時口味芳涼、不酸、多汁又無絲。

遭遇困難及解決方法：

(1) 易受風霜襲害，阻碍生長及結果率。
解決：促進風圃生長。

(2) 整枝角度過小、易被日燒害。
解決：棚頂遮蔭，減少日光直射果實。

成本計算：

五八、五九年，年產量合計八、七〇二台斤，年收金額七四、〇一〇元，支出部分種苗三〇〇元，棚架三、六〇〇元，肥料一、八六九元，農藥七三〇元，灌溉（電費）三四五元，合計六、八四四元，純利益新台幣六七、一六六元。

夏季包心白菜

第二名嘉義縣柯天註農友獲得；

柯農友的題目是「我對夏季包心白菜栽培經驗」。柯農友說：夏季氣溫高，多雨，蔬菜栽培不易，但是市場需要，而且價格偏高，因此引起他栽培包心白菜動機。


利用二分地「小鳳」西瓜採收後種植二期水稻前休閑期來栽培。

栽培面積二分地，品種濱綠六十天，栽培時期六月上旬，收穫時期八月上旬。

整地：六月一日開始整地，首先使用「飛布達」六公斤，撒布在田間，然後用耕耘機耕犁均勻，以防治地下虫為害。

作畦：行距三尺六，株距一尺六。硫酸六十公斤，過磷酸鈣五十公斤，氯化鉀二十公斤作為基肥。

播種：六月二日播種，首先以細碎堆肥作為株穴位置，點播後，再以



農事經驗發表冠軍：張輝元農友

細碎堆肥覆蓋。

病虫害防治：第一次六月八日以「馬拉松」一、〇〇〇倍，「大生M」四五〇〇倍防治，然後每隔七天噴霧一次，預防白斑病、炭疽病、露菌病、黑斑病、蚜虫、菜心螟、黃條葉蚤等病虫害的發生。使用農藥時注意採用低毒性農藥，尤其是在採收前十天，絕不可使用任何農藥。

施肥：

第一次水肥：尿素二十公斤。

第二次水肥：尿素四十公斤。

第三次穴肥：硫酸銨六十公斤、過磷酸鈣五十公斤、氯化鉀四十公斤。

第四次撒布溝底：硫酸銨七十五公斤、過磷酸鈣五十公斤、氯化鉀四十公斤。

第五次撒布溝底：硫酸銨六十五公斤、過磷酸鈣五十公斤、氯化鉀二十公斤。

灌溉：第一次七月七日，第二次七月十六日，因本季高溫多雨，只灌溉二次。並隨時作中耕除草。

多角化經營

第三名是台東縣陳文瑞農友獲得，他的講題是「我的農業機械化與多角化經營」。

陳農友說：他在五七年十一月買久保田耕耘機一台，一年自耕八甲六分，代耕十八甲左右，用機耕節省勞力，又可從事副業生產，同時選購養母豬二頭（藍瑞斯×約克夏），然後交配杜洛克公豬，每年出售肉豬四十頭，青飼料配合牧草，減少成本。

由於使用機械作業配合飼養毛豬，水稻、蔬菜的農牧綜合經營以後，五十九年度的盈餘比五十七年增加到三三、八三九·一〇元。（黃永順）