



夏威夷甜玉米

如何栽培？

台北區農業改良場 李國明

夏威夷甜玉米的栽培要點如下：

整地

勵行深耕十公分以上，並實施地下害虫防治，以「阿特靈」可濕性粉劑，每公頃用藥量六公斤，加水一〇〇公升，均勻洒於地面後翻犁，並用刈耙破碎土塊。碎土宜細，以免影響發芽。

播種

時期：春作二至三月，秋作八至九月。
行株距六〇×三〇公分，每公頃栽培約五、五〇〇株左右。
播種量每公頃二〇公斤。
播種法：按行距開播種溝，按株距點播種子兩粒在溝內後覆土。

管理

(1) 間苗：播種後二十天以內實行，留健全苗一株，並中耕除草及小培土。
(2) 中耕除草：全生育期中應

肥後，應停止中耕，第三至第四次中耕除草時應同時培土，高度以八公分左右為宜。

(3) 灌溉排水：甜玉米生育初期應保持適當水分，尤其開花期所需水分更多，不可缺少，應設法灌溉，主要在雄花抽穗前後應保持土壤濕潤。

行三至四次，第一次，於苗高約三公



玉米苗加工製罐（林吉郎）

農藥業者的福音！

唯一由基礎原料開始，專門農藥用乳化劑及展着劑原料的製造並技術服務。

PARACOL

VANNOX

SANIMAL

NEWCOL

MINEMAL

DISROL



中日合成化學股份有限公司

台北縣樹林鎮中山路二段21號

，如遇驟雨，幼苗期應注意排水。

病蟲防治

病害防治

(1) 露菌病：
① 一旦發現病株，應立即拔除燒毀。② 不可與甘蔗間作。③ 發病嚴重地區暫勿栽種。

(2) 玉米煤紋病
(葉枯病)

本病於春作較易發生，尤其於生育後期應特別注意防治，以「錳乃浦」或「鋅乃浦」可濕性粉劑四〇〇倍稀釋液，每隔十天噴射乙次。

蟲害防治

玉米螟：① 生育初期及雄花抽穗

肥料種類 施肥時期	堆肥	硫酸銨	過磷酸鈣	氯化鉀
基肥 (播種前)	10,000	200	350	120
第一次追肥 (播種後15天)	—	200	—	—
第二次追肥 (播種後25天)	—	100	—	—
第三次追肥 (播種後30天至35天)	—	100	—	—

玉米苗採收(林吉郎)



前一周可分別噴射四五%「一品松」乳劑一〇〇〇倍稀釋液。
② 雄花抽穗時拔除有虫孔的玉米穗，並燒毀。
③ 雄花抽穗後約十天，噴射五〇%「加利保」可濕性粉劑五〇〇倍稀釋液防除。

施肥

施肥的時期和數量，如上表。(單位：公斤/公頃)最後一次追肥不可超過本葉第六葉片時施用。

收穫

甜玉米收穫期應以七分成熟左右為宜，通常播種後七〇至八〇天左右或授粉後二五至三〇天即可收穫。

用途

(1) 可供煮食、烤食等。
(2) 製成玉米漿，加工製罐供應內外銷。
(3) 冷凍供應外銷。

註冊商標21510號

益農產

低毒性・無藥害

防治

水稻害蟲、蔬菜害蟲

綜合劑

非劇毒農藥

噴藥後蟲死率

6小時 60%
12小時 100%

殘效性二星期

註冊商標15139號

荷蒙綠

(植物生長荷爾蒙劑)

精製綠色結晶體

不是粒劑謹防冒仿

含有植物生長所必需各種微量元素荷爾蒙

每包貼有檢驗局保證票

促進生長・回復元氣
施肥過量・缺肥障害
調整產期・提高品質

註冊商標21281號

必愛用

水稻二化螟蟲
老牌防治藥

殘效性

比巴拉松約長數倍

混用馬拉松
可抑制馬拉松分解
發揮其相乘效果

日產★農藥

臺灣日產化工股份有限公司

台北市內湖區安康路一四〇號

TEL. 771348
710516