



夏威夷甜玉米

如何栽培？

台北區農業改良場 李國明

夏威夷甜玉米的栽培要點如下：

整地

勵行深耕十公分以上，並實施地下害虫防治，以「阿特靈」可濕性粉劑，每公頃用藥量六公斤，加水一〇〇公升，均勻洒於地面後翻犁，並用刈耙破碎土塊。碎土宜細，以免影響發芽。

播種

時期：春作二至三月，秋作八至九月。
行株距六〇×三〇公分，每公頃栽培約五、五〇〇株左右。
播種量每公頃二〇公斤。
播種法：按行距開播種溝，按株距點播種子兩粒在溝內後覆土。

管理

(1) 間苗：播種後二十天以內實行，留健全苗一株，並中耕除草及小培土。
(2) 中耕除草：全生育期中應

肥後，應停止中耕，第三至第四次中耕除草時應同時培土，高度以八公分左右為宜。

(3) 灌溉排水：甜玉米生育初期應保持適當水分，尤其開花期所需水分更多，不可缺少，應設法灌溉，主要在雄花抽穗前後應保持土壤濕潤。



玉米苗加工製罐（林吉郎）

行三至四次，第一次，於苗高約三公

農藥業者的福音！

唯一由基礎原料開始，專門農藥用乳化劑及展着劑原料的製造並技術服務。

PARACOL

VANNOX

SANIMAL

NEWCOL

MINEMAL

DISROL



中日合成化學股份有限公司

台北縣樹林鎮中山路二段21號