

肥料種類 施肥時期	堆肥	硫酸銨	過磷酸鈣	氯化鉀
基肥 (播種前)	10,000	200	350	120
第一次追肥 (播種後15天)	—	200	—	—
第二次追肥 (播種後25天)	—	100	—	—
第三次追肥 (播種後30天至35天)	—	100	—	—

病蟲防治

，如遇驟雨，幼苗期應注意排水。

病害防治

(1) 露菌病：
① 一旦發現病株，應立即拔除燒毀。② 不可與甘蔗間作。③ 發病嚴重地區暫勿栽種。

(2) 玉米煤紋病 (葉枯病)

本病於春作較易發生，尤其於生育後期應特別注意防治，以「錳乃浦」或「鋅乃浦」可濕性粉劑四〇〇倍稀釋液，每隔十天噴射乙次。

蟲害防治

玉米螟：① 生育初期及雄花抽穗



玉米荷採收 (林吉那)

前一周可分別噴射四五%「一品松」乳劑一〇〇〇倍稀釋液。

② 雄花抽穗時拔除有虫孔的玉米穗，並燒毀。

③ 雄花抽穗後約十天，噴射五〇%「加利保」可濕性粉劑五〇〇倍稀釋液防除。

施肥

施肥的時期和數量，如上表。(單位：公斤/公頃) 最後一次追肥不可超過本葉第六葉片時施用。

收穫

甜玉米收穫期應以七分成熟左右為宜，通常播種後七〇至八〇天左右或授粉後二五至三〇天即可收穫。

用途

(1) 可供煮食、烤食等。
(2) 製成玉米漿，加工製罐供應內外銷。
(3) 冷凍供應外銷。

註冊商標21510號

益農產

低毒性·無藥害

防治

水稻害蟲、蔬菜害蟲

綜合劑

非劇毒農藥

噴藥後蟲死亡率

6小時 60%
12小時 100%

殘效性二星期

註冊商標15139號

荷蒙綠

(植物生長荷爾蒙劑)

精製綠色結晶體

不是粒劑謹防冒仿

含有植物生長所必需各種微量元素荷爾蒙

每包貼有檢驗局保證票

促進生長·回復元氣
施肥過量·缺肥障害
調整產期·提高品質

註冊商標21281號

必愛用

水稻二化螟蟲
老牌防治藥

殘效性

比巴拉松約長數倍

混用馬拉松
可抑制馬拉松分解
發揮其相乘效果

日產★農藥

臺灣日產化工股份有限公司

台北市內湖區安康路一四〇號

TEL. 771348
710516