

大量灌水，但水不宜滿過畦面。如此約四至六天即成活。

本田的管理：馬耳白菜需水量較大，在水量充足時生長十分迅速，但亦忌長期潮溼，否則易患軟腐病。

高畦可便於灌溉排水，灌溉水切勿澆過畦面，否則易使土壤緊結，致使根部窒息，或根羣不能伸長而生長不良或患軟腐病。

灌溉次數在初期每隔三至四日一次，中期每隔二至三日一次，末期隔五至六日一次。移植後直到採收可以不必除草，因移植後十至十五天菜葉即可遮蓋畦面。

生長中期視生育情形可以酌量施用尿素二至五公升。生長期間隨時注意病蟲防治。

收穫：定植卅天至四〇天即可採收，視市場價格而定。在早期收穫，每分地約三千台斤。晚期收穫（四〇天至五〇天）可收五千至六千台斤。收穫

以鐮刀齊葉莖交接基部處切下，待稍凋萎後即可裝箱運到市場。

颱風後的處理：在颱風之後立即噴灑〇・三〇硫銨作葉面施肥，並培土，施入少量尿素。如此七至十天即可恢復。

生理病害比較嚴重的有心腐病。心葉葉緣水浸狀褐變，甚至心葉曲縮畸變。嚴重時變油浸狀或泥狀。有的外觀雖正常，但切斷莖部時可見莖內部變黑或腐敗。這是缺鈣（石灰）或缺硼的現象，在酸性土壤和缺水的土地發生最多。防治法有①不要多施氮鉀肥，尤其是生理酸性肥料如硫酸銨、硫酸鉀。

②深耕並多施堆肥。③注意灌溉，勿使過分缺水。④酸鹼度五的砂質壤土，每一分地通常施用石灰二八〇至三〇〇公斤，五・五時施二〇〇公斤；耕犁前施入半量，耕犁後再施半量。⑤酌量施入硼砂，每分地一至三公升。

病害比較嚴重的有軟腐病。發生在莖和葉柄基部。

優良夏季蔬菜新品種——

馬耳白菜種子

開始現貨供應

農林廳種苗繁殖場
地址：台中縣新社鄉大南村中和街341號

歡迎購買

- ▲包裝：每包五〇公克
- ▲售價：每包七元，凡一次購買二〇包以上者，特優待每包只售六元
- ▲凡一次購買二〇包以下需加收郵寄費七元，廿包以上一律由本場負擔寄費
- ▲凡一次購買五包以下請以郵票代資寄下，五包以上匯款可利用郵政劃撥中字第二一八〇四號本場帳戶



死鼠無毒，人畜無害，安全可靠。
最有效！最經濟！

殺鼠靈毒餌餅

農復會、農林廳、糧食局 共同推薦
台糖公司、台灣省農會
台北市政府衛生局家鼠防治專用
台灣省鼠害防治推行委員會 長期採用
本公司加工供應《獨家供應》

嘉泰企業股份有限公司

公司：台北市仁愛路三段26號二樓
電話：776815・782796
工廠：台北縣中和鄉員山路100號
電話：96-5466

啓事

鳳山園試驗所通知，贈送落葵和巴西菟種子，每人限十公克，除郵費一元外，另收包裝費九元，計十元。

部。起初為水浸狀，隨後軟化崩壞，發生腐敗性惡臭，葉部急劇凋萎。軟化惡臭為特徵。防治法：①選擇通風排水良好的無病地栽培。②築高畦，避免密植。③拔除病株。④驅逐夜盜蟲等害虫。⑤耕作注意不傷及植株。

撤紋病（毒素病）是僅次於軟腐病的病害，是一種全株性病害。被害葉萎縮，生長衰退，發生淡綠和黃色的撤紋，易與硼素或鎂素缺乏之症混同。防治法：①立即燒燬病株以防蔓延。②防治蚜虫、黃條跳蚤和浮塵子等媒介昆虫。

其他病害有黑斑病和露菌病等，但為害很小。虫害有夜盜虫、吊絲虫、蚜虫、擬尺蠖、青虫和黃條跳蚤等。按一般方法防治即可。