

種母猪的管理方法

母猪的管理，除注意發情、配種年齡和配種方式外，其他一般管理方法大致如下：

寄生蟲的驅除

農家的母猪，多半是由專門養公猪者的公猪配種，很容易被公猪傳染各種疾病和外寄生蟲，因此農友們應特別注意。配種前應了解公猪情況，交配後，應施行除蟲。通常外寄生蟲以猪虱為多，若猪虱不加以除去，以後將寄生於小猪身上，那就很難驅除了，且會直接影響小豬的發育率。

妊娠期管理

妊娠期中，種母猪的管理非常重要，此時期若管理得好，將來生產成績也好，若管理欠佳，往往招致失敗。母猪於正常情形下，配種以後，經過二十天，假如沒有再發情，即表示已經受孕了。

從這個時期開始，便要注意飼養管理，到分娩時期，才能順利生產，仔豬發育良好。

有的到了生產期，不能生產，有的發生難產，有的生下死胎，向這種怪現象，都是由於母猪在妊娠期常於豬欄內，沒有給牠充分的運動，和適當的飼料的結果。

有時母猪配種後，經過三個月，又會發情，這種現象多半是母猪身體衰弱，由於母猪體質微弱，因此，只發現輕度的發情，而發情時間很短。一般人認為畜生一次配種即可以成功

，不重視以後輕微發情的現象。

還有當配種後確有卵子受精，但由於母猪身體衰弱，排卵少，這種少數的受精卵到了子宮體，附着子宮壁，得不到充分的營養，結果不但不能發育，反而被母體吸收。因此經過一段時期，又開始發情。因此養母猪的人，應經常注意母猪的營養和良好的管理。

流產期的預防

母猪妊娠期中，最可怕的是流產，流產的原因有三種，第一種，完全由於管理上的疏忽，如懷孕母猪和其他的豬關在一個豬欄內，打架爭鬥，或者是猪舍過滑，母猪容易滑倒，使母猪受劇烈的震動，或由於管理的粗暴等，都容易使母猪發生流產。

第二是妊娠期中，營養失調和飼料變質。

第三是由於病體的原因，也有由於公猪常配流產過的母猪，而由病菌的傳染引起流產。

妊娠期的特徵

母猪配種後，經過三個月，腹部便漸漸的膨脹起來，在分娩前三個星期，用手按摸母猪腹部，可以感覺到胎兒的微動，那時乳房、乳頭也漸漸腫大。

到分娩前十天，胎兒跳動更加明顯了，到了分娩前四、五天，陰部變紅色而腫大，到分娩前五、六小時，母猪便呈不安定現象，此時便開始啣

草作窩，這時靠近胸部的乳頭，用手擠按，可以分泌出乳汁來。

分娩前注意事項

母猪的妊娠期大約為一〇九日，一、二日之間，但有時也提早三、五日，有時也會延遲二、三日，提早和延後對於小豬的健康與發育沒有影響。如一窩仔猪頭數多必提早生產，若延長至五日以後，所生出的成績一定不理想。假如一窩中間有一、二頭是死胎，或者是身體衰弱，經過一兩天後漸漸死亡，最後在一窩仔猪中只剩下半數。

這主要是由於母猪在妊娠期中，缺乏運動和飼養不當。母猪分娩前應注意下列幾點：

(一)猪舍的打掃，分娩前二、三天，應將猪舍打掃清潔，敷上新而乾的稻草，但稻草不宜太厚，最好先把稻草切成五、六寸長，這樣可以避免初生仔猪纏絆跌倒，被母猪踐踏受傷，或壓死的危險。

(二)猪舍要裝置防壓欄(橫木)，靠近猪床兩邊，離牆一尺，離地面高八寸，各架一橫木，預防初生小豬被壓死。

(三)猪舍和各種用具應消毒清潔。(四)母猪應使他靜養休息，切勿讓其他動物來吵擾。

分娩時注意事項

猪快要分娩時，起臥不安，在開始分娩二三頭時，大多是站立着生產，後來母猪因漸漸感到疲勞便倒臥下來生產，最後全是倒在床上生產。

仔猪生出來的時間，每頭大約相隔十五分至一小時，有的要間隔三四小時。

相隔時間久的原因是母猪過肥或缺乏運動。

在正常情形下，自開始生產到胎衣排出，所經過時間，外國種大約三、四小時，本地種大約二、三小時。遇有難產時，應請獸醫來救助，設法取出，不然母猪也有危險。

難產的最顯著現象，就是在開始分娩時，先發生陣痛，使母猪坐立不安，陣痛之後，接着看見母猪努力，使用全身的力量，想把腹內胎兒生產出來。

但是這種動作經過長久之後，仍舊沒有看見小豬生出來，而母體已漸漸顯示出疲倦無力，只用極輕微的用力了，這時畜主應速設法營救。

營救方法：將手洗淨消毒，塗抹油劑，把難產小豬緩緩扶正取出，難產小豬多半是胎位不正常，橫倒於產道內，所以母猪盡管用力，結果還是不能生出來。

假使不設法取出，因經過時間太長，母猪用力過多，過分疲勞，結果連母猪都有死亡的危險。(苗栗縣卓蘭鎮坪林里三十一號賴榮生)

