

# 菊花·玫瑰

黎民敬

## 切花生產技術的改進

### 培育優良種苗

菊花的扦插苗，必需在沙質苗床中，以有噴霧和良好排水設施的環境下培育（次頁附圖）。

苗床四周和底部以混凝土構成基座，底部略呈V字形，最低的中央部分和最高的邊緣，高低差約在二英寸左右最宜。底層中心部埋設口徑三英寸左右的PVC管，管身密鑽排水小孔，上鋪數層石礫，再填上粗沙。選取插穗時，避免用不充實和葉色淺的徒長苗。發根後立即移出種植。

本省玫瑰壓條苗的生產，可說是世界花業中的一典型，因為歐美以至日本都以採用接木苗為主。經長期的栽培試驗，證明這種育苗法尚合目前環境的需要。但最須注意自包紮塑膠布外觀察時，見有均勻紅白色細根出現於水苔四周，方可取下種植，否則日後發育不能均衡或生長緩慢。又定植後幼株期即應剪定，將首先發出的壯枝在第一或第二組五小葉片展開時自上面去頂，其餘稍弱的枝也在稍後如法去頂。

### 控制生產時間

無論菊花或玫瑰的育苗，都應在採穗前作好病虫害防治工作。苗床宜以「福馬林」或「氯化苦」薰蒸，待十餘日藥味消退後方可使用。

菊花可完全以電照和黑布遮光控制開花。

冬季短日時必須有電照設備。夏季長日時可以黑布遮光。以台中地區為例，要想順利生產夏菊，必須自四月中旬開始至七月下旬止，每日清晨四時至七時，旁晚四時至七時，以黑布遮光。

玫瑰可以主枝去頂方法控制開花。主枝如自第一或第二組五片小葉上方去頂，長出的新枝在夏季約經五周，冬季約經七周，可得二尺以上符合標準的切花。

例如要想在端午節上市的切花，應在農曆四月一日前後去頂。要想在春節上市的切花，應在農曆十一月十日前後去頂。

### 肥料施用標準

一般說來，切花生產地的土壤多缺乏有機質。玫瑰栽培地的有機質含量，最好有四〇%，如果少於二五%，乾燥時地面容易龜裂。

菊花栽培地的有機質含量雖可稍少，但缺乏時仍易引起發育不良和病害。

菊花化學肥料可按七—七—七的比例配合，每一百平方尺施用九百公分，分兩次施用；第一次在種植後四至六周，第二次在花芽分化時。

玫瑰應在定植前翻耕土地時，將

# Rodmeth.

西德 CHEMIE HANDELS G.M.B.H.

原裝出品

(北市農藥字第0432號)

# 大減速

現貨供應處：


正凱企業有限公司

台南市東門路407號三樓 TEL.27567

嘉南農光資材行

台南縣善化鎮中正路一號之2 TEL.214

總代理：恒興源企業股份有限公司



請注意！本「大減速」自進口以來，

蒙各農用戶愛用，惟最近市面發現贗品，為免受騙，謹請逕向下記供應處採購是禱。

