

磷肥和堆肥同時均勻翻入土層中。

磷肥用量約每一百平方尺二、三公斤。以後每隔一年補施一、三六公斤左右。在翻耕土地時施入與磷肥等量的白雲石粉更佳，因白雲石粉除可代替石灰中和土壤酸性之外，且可供給玫瑰必需的鈣肥。

氮鉀肥在生長開始後兩、三個月施用，一般為每一百平方尺氮肥約四五〇公分，鉀肥約二二五公分。第二年約每隔三、四周施一次。第三年以後每二周施一次。但冬季施用應比夏季稍少。

骨粉和豆餅浸出液，都是很好的有機肥，在生產期中施用，可促成優良切花不斷產生。

(以上所列化學肥料，都以硫酸、氯化鉀(加里)和過磷酸石灰為準。)

病虫害防治

本省氣候高溫多濕，花卉容易發生病虫害。菊花和玫瑰常見病虫害防治要點如下：

(一)白粉病：保持行間部分乾燥，株間適當通風。發現病徵時應及早施用石灰硫黃合劑或「可利生」防治。

(二)黑點病：不要自上而下全株澆水，尤以高溫期為然。用 Parzate、Manzate、Fermate 等農藥防治，效果很好。

(三)頸腐病：菊花苗期最易發生本病，由母株或土壤澆水傳染，尤以連作地為嚴重。發病時立即拔除病株，用「萬靈」(Clannate) 或 Ferimate 防治。

(四)花腐病：露地栽培雨期最容易發生，可施用 Parzate 防治。最好在

塑膠棚下栽培，既可減少發病機會，又可提高農藥和肥料功效。

(五)葉枯病：因澆水濕而感染，用「飛邦」防治最有效。

(六)紅蜘蛛和蚜蟲：噴灑有機磷劑，約四至七日一次。


(七)不同農藥輪換使用，可提高效果。

(八)線虫：常由母株或澆水傳染。可用 Nematic 乳劑作土壤灌施防治。

切花和裝運

玫瑰在切花時，應於行間放置水桶，切下後立即將莖幹下端浸於水中。菊花雖不必如此，但運銷前應置於水中至少四小時，方可在運銷時保持新鮮。

據花卉批發商的統計，各產地送到的切花約二〇%為運輸損害品，五〇%以上為不合標準的產品，日後如從事外銷，將增加無限困擾。為此，台灣大學與農林廳特產科正從事以紙箱代替草繩草袋切花運銷包裝方法的研究之中。



標準杆插用沙質苗床

榮獲 農林廳推薦在全省柑桔增產改進計劃中指定示範施用之榮譽產品——

60.2.9經濟日報
60.5.4中國時報

農林廳推介柑桔園土壤中施用苦土石灰：

本(59—60)年期試銷日本市場的本省產柑桔被認為糖酸度不夠，品質不佳經省農林廳研析結果，認為是果園中土壤缺乏「苦土石灰」所導致。於本(60)年度起推介正泰公司產品「特煉苦土」(苦土石灰)連續示範施用三年，希望能使果園中的土壤獲得改良。

姊妹品：

植維素
碳酸石灰

(苦土石灰)

特煉苦土

土壤救星

備有農林廳訂定之柑桔栽培管理行事曆，病蟲害防治曆及精美說明書歡迎來信索取



正泰工礦股份有限公司

地址：桃園縣楊梅鎮光華路12號

TEL. 150.1.