


孤挺花：外銷潛力很大的球根花卉

劉鳴生



上：本省有種大花多花莖的孤挺花
下：民國五十年由荷蘭引進的孤挺花

變化，以紅、粉紅、純白為主。

現在栽培的品種，都是雜交改良種。

花徑大，花瓣圓而寬，花色多，有朱紅、猩紅、橙紅、粉紅、荷菊紅、紫玫瑰紅、白等等，再加上深淺中間色調、斑點、條紋和鑲邊等變化，總數不下幾十種。唯一的缺點是子球產生很難。

孤挺花

因原產熱帶地區，所以喜愛充足的陽光和較高的溫度。生長溫度約為攝氏二十五度，開花適溫攝氏二十八至三十度，發芽溫度攝氏二十度。對土壤的選擇性不强，只要排水良好，略含有機質的，都能適合。種植時，將種球的三分之一至二分之一埋入土中，充分澆水，六至八周後便可開花。花開始形成時起，應施足夠的液肥。一朵花可開五至八天，又因陸續的開，所以花期很長。

開 過花後仍需施肥，讓葉子繼續生長，球根肥大。當葉子開始變黃時，停止施肥和澆水，使順利進入休眠期。

本省平地冬季不降霜，可無需掘球儲藏。任其

留在田間，到翌年春天可再生長開花。


如 為某種原因需要掘起時，應連根挖起，除去已死的老根，保留活根，否則翌年只能抽花莖而不長葉。活根裝箱後，存放在攝氏三至七度的冷涼處，直到種植時為止。

開花經授粉約一個半月後，種子即已成熟。種子為扁圓形，褐色，一種莢可收到五十至一百顆。收後除去種翼，立即播於鉢或木箱內，薄覆培養土，維持適當濕度，二十天便可發芽。待種球長大至開花，需二至三年。

另 一種方法，是將大球放射狀縱切為十六塊，每塊再連同基部短莖分為數塊，各帶三至四片鱗片，拋棄中間幼嫩的一圈，斜插在砂床中，保持潮濕（但水分不能過多）。經五十至六十天後，在短莖和鱗片連接處發生二至三個小球，其中只有一個長大，俟二、三個月根莖形成後把它分離。

孤 挺花是最適合鉢植的一種花卉，生長迅速，病蟲害少，花大而變化多。在外國一般家庭，除鉢植外，也在花壇栽培，消費量很大。據國外種苗目錄記載：非洲系統的雜交種每球售價達三・九五至四・八五美元；荷蘭系統為三・五〇至三・七五美元；美國系統為三・五五至四・四五美元。本省氣候溫暖，是天然的花卉溫室，配合低廉的勞工，可以生產孤挺花種球外銷。此外，利用促成栽培法可提早花期，於聖誕節前後外銷歐美市場，或於舊曆年時外銷東南亞。

孤挺花切球繁殖



目前本省尚無孤挺花的專業栽培者或育種者，在這花卉事業逐漸開始抬頭的時侯，希望大家特別注意孤挺花。