

唐清岑：

幼火雞的飼養管理

(一)消毒：育雛舍、育雛器及四周環境應在進雛一周前加以洗刷，嚴格消毒及檢修完善以備用。

(二)保溫：幼火雞的保溫與雞相似，第一周攝氏三十五度，以後每周降低攝氏二度七。通常保溫三周，寒冷季節保溫四周，再漸進廢溫。

育雛箱應在幼火雞放入前半小時給溫，如無育雛器可自己釘製箱子，用六〇—一〇〇燭光的灯泡吊在箱內，以供取溫。掛灯泡的高低，可視雞分散情形而決定，以火雞呈均勻散開為宜。

(三)初餵：幼火雞孵出三六—四八小時後，由全羣的活動顯示出已有食慾，此時應將飼料撒於乾淨的紙張上教槽，一、二天後，即可將飼料改放在接近幼火雞易於採食的飼槽內。

(四)飼料：幼火雞的營養需要比雞為高，〇—八周蛋白質二八%，八—十六周二〇%，十六周以後可減至一六%。初生到八周的幼雛期內如用幼雞飼料時，應另混合五%的魚粉及一%的貝壳粉增加營養。八—十六周的生長火雞，可用育成雞的飼料。

供料時以每次可以吃完為準，第一周到八周間每天給料五次，九至十二周每天給料四次，以後可按早、中、晚三次給料即可。八周以後可行放飼，如當作肉用火雞，雌雄可以混飼，以便肥育後可以整批出售。如當種用，應於此時分飼，待雌火雞開始產

蛋前半個月再混飼以便配種。

小火雞喜吃青葱及菜類，可切細混於飼料中飼餵，添加量為一〇—二〇%，可節省飼料，增加收益。

(五)管理：注意火雞發育的整齊及預防密飼。當移雞時，應隨時注意發育不良的雞，以提高育成率。

此外，育雛舍、育雛器周圍要保持乾燥，育雛舍的通風換氣要良好，每日至少洗滌飲水器一次，給料時應隨時添加清水。

(六)防疫：幼火雞二周齡時需種痘，三周齡時檢查發痘情形，如發痘不好應再種痘一次。

新城雞瘟及家禽霍亂應定期施行預防注射，劑量隨體重及周齡增加。

(七)疾病：幼火雞在孵出一周內如保溫不夠，或換氣不良，或因病菌污染，常致乾脚或屁股有糞，漸漸的因食慾不佳而死亡。可在飲水中滲入抗生素或磺胺劑。雞痘很難治療，如屬輕症可將出痘的肉挖淨，用碘酒消毒後呈乾痂時再剝除痂皮。如痘長在眼部，可塗抹眼藥膏防失明。



“DIOSTOP®”

Dimethoate 50% E.C.

西德
先靈

大滅速

防治—柑桔：紅蜘蛛，介壳蟲類
果樹：膠蟲，介壳蟲類
菸草：夜盜蟲，蚜蟲



西德先靈大藥廠 出品
(SCHERING AG BERLIN)

總代理：健立貿易有限公司
台北市中山北路一段135巷29—1號
TEL. 515449 · 541144

“CHEM NEB®”

Maneb with Zinc added

健立生

80%
W.P.

(金錳乃浦)

防治—蔬菜、果樹、柑桔、大豆
洋菇、香蕉、瓜類、蕃茄
等作物之一般病害。



美國 Chemical Insecticide Corp. 出品

總經銷：大昌農業資材行
台南市公園路64號
TEL. 台南20351