

施肥量：蘆筍是多年生的作物，每年採收期長達七、八個月（在本省南部），因此對肥料的需要量也較其他作物多。

一般施肥量每十公畝白蘆筍約需堆肥三〇〇〇公斤、氮素八〇〇~一二〇〇公斤、磷素二〇〇~三〇〇公斤、鉀素為四〇〇~五〇〇公斤。綠蘆筍因栽培密度肥料需稍多些，約為每十公畝堆肥三〇〇〇公斤、氮素一〇〇〇~一四〇〇公斤、磷素二五〇~三五〇公斤、鉀素為五〇〇~六〇〇公斤。

蘆筍的年齡也是決定蘆筍施肥量的因素之一，年齡愈大施肥量也愈多，一年生所需的肥料可取前述肥料量的最低量，二年生則比一年生所需的肥料要多，三年生以上又酌增。

施肥時期：可分春肥、夏肥、秋肥、採收肥，各期的施肥時間及施肥量如下表。

施肥法：(1) 春肥、夏肥、秋



蘆筍生長情形

肥料時期	堆肥	氮素	磷素	鉀素
春肥 (三月)	50	15	40	20
夏肥 (七月)	—	10	20	10
秋肥 (十一月)	50	15	40	20
採收肥 (十二月)	—	60	—	50

肥必須採用雙邊條施，肥料分配比較平均，根羣分布也平均，生育較佳。
(2) 採收肥於採收期間施用，每月分二次施用，即每隔半月施用一次，可採用單邊穴施，上半月施左邊，下半月施右邊。

(3) 如栽培綠蘆筍，則堆肥必須與「飛布達」殺虫劑混合施用，每十公畝「飛布達」用量為三、五公斤，以防治地下害虫傷害嫩莖。

(4) 施肥深度，白蘆筍為二、三〇公分，綠蘆筍為十五、二十公分。施肥太淺，將使根盤一年一年提高，培土也因此逐年加高，除影響產量、品質外，必使植株壽命縮短。
(5) 施肥後即行灌水，以促進肥料的分解，供給植株吸收。

使用施肥鏟

蘆筍採收期間長，必須經常施肥，如施肥不得要領，將要花掉很多人工。蘆筍施肥可使用施肥鏟（式樣如前頁圖），可採用穴施，利用施肥鏟於畦邊挖下再拉起，土壤因施肥鏟為圓筒形，而被攜帶上來，施下肥料後，再把帶上的土壤覆下。一人操作一人施肥，每分地只要四〇分、一小時即可施完，節省不少人工。

新進口優異農藥

北市農藥字第0816號



保克速[®] 300 乳劑

——本劑對於下列各種蟲害，具有特殊殺蟲效果——

- 水 稻：黑尾浮塵子、褐飛蝨、二化螟、白背飛蝨、大螟、盲椿象、潛葉蠅。
- 香 蕉：粉介殼蟲。
- 玉 米：玉米切根蟲之幼蟲。
- 馬鈴薯：馬鈴薯浮塵子
- 葡 葡：葡萄浮塵子。

歡迎試用比較！

製造廠：CHEVRON CHEMICAL INTERNATIONAL, INC.
AGRICULTURAL CHEMICALS DIVISION.
台灣總代理：惠 農 股 份 有 限 公 司
地 址：台北市長安東路二段16號二樓 TEL. 552093
進 口 商：泰 洋 股 份 有 限 公 司
地 址：台北市重慶北路二段108號 TEL. 544994