

林進益—— 美化環境用的球根花卉 6 種

晚香玉

生育期間的氣溫，以攝氏十二至二十五度為宜。日照需良好。土壤以較粘性的壤土為宜，過於疏鬆的土壤，使根部發達，但開花不良。

一般都用分株繁殖。母球雖不消失，但花後養分消耗很大，不用為繁殖體。

栽植期在本省北部以春季為宜，南部則秋季及春季均可。切花用或花壇的栽植，行距四十公分，株距三十公分，每穴栽植二—三球，栽植深度十公分左右。

栽植後土壤應經常保持濕潤。肥料除基肥外，應每月施一次追肥。栽培二、三年後，應更新栽植。

海芋

性喜肥沃並潮濕的壤土，有濕地用種和旱地用種之別。濕地用種一般生長適溫為攝氏十五至二十度。旱地用種較耐高溫，生長適溫為三十度。

一般分離小球繁殖，自栽植至開花，需一年時間。播種繁殖亦可，但至開花期需近二年時間。

九、十月是栽植的適期。株、行距各為三十公分。

百合

種類很多，且性質各異。大抵喜好排水良好的沙質壤土。忌強光，所以須選不受強光照射之處栽植，且應避免連作。

可用種子、子球、鱗片或大球等繁殖，但以大球繁殖的，開花較好。

一般在春季栽植。促成栽培以秋季為宜。促成

栽培的球根，需經低溫處理，打破休眠。行距二十五公分，株距十五至二十公分。鱗莖在栽植前，應用「烏斯普龍」一千倍液消毒三十分鐘。栽植時應施基肥。生長期間應施二次追肥。

定植後應鋪稻草，以保持土壤疏鬆和水分。抽花穗時，應立支柱扶持。六、七月間，可掘取球根，風乾後儲藏。


小蒼蘭

生育適溫為攝氏十五度。花芽分化前以短日照為宜，分化後宜為長日照。栽培土壤以粘質壤土為佳。

繁殖方法有播種和子球分離二種。一般以秋季栽植為宜。行距為五十公分，株距為三十公分。

病害多，要避免連作。球根應先行消毒。

彩葉芋



彩葉芋

發育適溫為攝氏二十五度以上。日照不需太強，以五〇多照度為宜。土壤以富含有機質的沙質壤土至粘質壤土為宜。因為喜好多濕，應保持土壤濕潤，切忌



美人蕉

乾燥。

繁殖方法一般採用分球法。亦可分切母球為數塊繁殖。

二月中旬至四月中旬定植球根，盆栽的每盆置二—三球。

生育期間應勤加澆水。五月後日光過強，應加竹簾遮蔭。

美人蕉

原產熱帶，所以需要高溫和充足的日照。

對土質選擇不嚴，但以濕潤而富含有機質的土壤為佳。

一般採用分株法繁殖，但亦可播種繁殖。三至十月間均可栽植，每間隔五十至一百公分栽植一株。

開花期間消耗水分特多，應勤加澆水。此外，應每間隔一個月澆施腐熟人糞尿一次。