


芒果病虫害綜合防治方法

時期	防治對象	藥劑及稀釋倍數(濃度10公升)	防治方法
2月—4月	螟蛾	50%速滅松乳劑10cc(1000倍) 50%芬殺松乳劑1000倍 85%加保利可濕性粉劑850倍	(1)新梢生長後連續二次 (2)開花期(花苞形成)開始每隔十天一次,連續二至三次,盛花期停止用藥。 (3)昆虫授粉期避免噴射殺虫劑。
	炭疽病	50%免賴得可濕性粉劑10cc或克(1000倍) 80%大富丹可濕性粉劑25克(400倍) 70%安收多可濕性粉劑25克(400倍) 16.5%紋枯乳劑10cc或克(1000倍)	(1)新梢生長後連續二次。 (2)開花期(花苞形成)開始每隔十天一次,連續二至三次,盛花期停止用藥。 (3)大富丹不可與其他藥劑混合。
	白粉病	22.5%可利生可濕性粉劑10克(1000倍) 25%魔立死可濕性粉劑	(1)新梢生長後連續二次。 (2)開花期(花苞形成)開始每隔十天一次,連續二至三次,盛花期停止用藥。
4月—7月	螟蛾	50%速滅松乳劑10cc(1000倍) 50%芬殺松乳劑1000倍 85%加保利可濕性粉劑850倍	(1)自幼果形成時開始,十至十五天一次,連續四次。 (2)果實採收後防新梢遭害,應繼續施藥三次。
	炭疽病	50%免賴得可濕性粉劑10cc或克(1000倍) 80%大富丹可濕性粉劑25克(400倍) 70%安收多可濕性粉劑25克(400倍) 16.5%紋枯乳劑10cc或克(1000倍)	
	果蠅	(1)含毒甲基丁香油誘殺。 (2)25%馬拉松可濕性粉劑及蛋白質水解物加水100倍作毒餌撒布。	(1)每隔十天撒布一次。 (2)果實套袋亦可防治果蠅的為害。
	果斑病	50%好寶粉可濕性粉劑600倍,或用果實銅可濕性粉劑1000倍。2.5%武田微素400倍。2%嘉賜微素1000倍。	(1)每隔十天一次,連續三次。 (2)目前尚無效果特別好的藥劑。
12月—3月	褐浮塵子 綠浮塵子	50%賽文可濕性粉劑500—1000倍 (或用防治螟蛾藥劑亦可)	每隔十天一次,連續二至三次,盛花期停止用藥。



務請小心辨別

請認明 **DITHANE* M-45** 商標
大生*四十五

大生四十五(DITHANE M-45)係美國羅門哈斯公司榮獲世界專利之最新廣效性殺菌劑,能有效防治作物莖葉之主要病害,如一葉斑病、黑星病、晚疫病、露菌病、炭疽病及銹病。

大生四十五係鋅離子(ZINC ION)與錳乃浦化合物離子之結合成品,並非一般錳乃浦與鋅乃浦的物理性之混合物,因此大生四十五之化學性,物理性和生物性,具有獨特的性質,純係一種最新型的殺菌劑,與鋅乃浦,錳乃浦或是這兩者的混合成品絕對不同。

三磅紙袋原裝 大生*四十五(DITHANE* M-45)

◎說明書函索即寄



美國羅門哈斯公司出品

*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標

現貨供應:民豐化工廠股份有限公司

台中縣大肚鄉中和村中山路10之6號