



惹拔條播

〔問〕：(一)何謂條播法？惹拔自播種至疏苗這段期間，如何培植管理？疏苗後又怎樣管理？

(二)種植前如何整地？施肥情形、種類和分量各多少？

(三)那一個時期宜於種植？種植後至成熟期要多久？收割後是否可重新整地再種？

(四)條播的行株距各多少？播植株數多少？

(五)桃園藥材生產合作社的社址在那裡？該社所經營的業務有那些？(屏東縣枋寮鄉中寮村三〇號楊子欣)

〔答〕：(一)整地時同時施入所需的基肥混合後，作畦、開條溝，將種子撒在溝上，覆土二公分輕壓，稱為條播法。

種子播下後，需適度的灌水或澆水，待四、五天即發芽。生長至十分分時開始疏苗，將不健康的苗拔除或補植，使株距相隔差不多即可。同時苗生長至十五公分時，即可施第一次追肥，同時並注意病蟲害防治。此後需適時灌水及除草淺中耕，並按時施追肥。

(二)整地時，以犁翻耕，同時施入基肥，充分攪拌混合即可作畦。每分地基肥量如下：

腐熟堆肥一、五〇〇公斤，或用豆餅或茶子餅也可以。以含氮量而定，硫酸銨五十公斤、過磷酸灰三四公斤、氯化鉀十公斤。

(三)春播或秋播均可，但春播較好，如二、三月種植，七月即開始採收。收割後，無需重新再種，因惹拔是一種宿根禾草作物，只需施速效性肥料，即可萌芽，重新開花結果，如管理良好一年可收三次。

連續五年時，它的宿根衰退，此時可行翻耕，重新整地再種，最好行輪作，可保地力長期利用。

(四)條播行距五十公分，株距不一定，苗時約十公分左右，撒播於條溝上。

(五)桃園藥材生產合作社經營的業務，均為有關藥材收購、栽植與輸出等，社址在桃園縣桃園鎮安東街九三號。(徐原田)

乳牛飼養

〔問〕：(一)銀合歡的枝葉，是否可供荷蘭乳牛做飼料？

(二)公乳犢牛做肉牛，是否須去勢？去勢獸醫何處可以請到？

(三)公乳犢牛做肉牛，是否須穿鼻？如何穿法？

(四)除了做結核菌預防注射外，還須打那些預防針？

(五)在荔枝和釋迦園中間作牧草(狼尾草)，可否放牧？

(六)在傾斜度二十五度以上的山坡

地，飼養一頭肉牛，需要栽植多少牧草？

(七)一頭公乳犢牛值多少錢？(台中霧峰中正路七一號莊湧泳)

〔答〕：銀合歡葉葉可餵牛，但不要超過飼料總量的一半。

(一)一般來說，閩牛的肉質較好，管理方便，未閩的牛增重快，性情不好。所以公乳犢牛當肉牛飼養時，去勢與否，要由畜主自己決定。

去勢的獸醫，可請鄉鎮農會獸醫，或農校畜牧科教飼養管理的老師。

(二)公乳犢牛當肉牛飼養，為了管理方便，應該穿鼻，穿鼻的方法與水牛或黃牛一樣。

犢牛一歲時，用金屬製的鼻環，穿入鼻中前方沒有軟骨的部分。鼻環的上方，繫繩掛於牛角上，以免鼻環下垂，磨傷過甚或磨斷鼻鏡，如果鼻鏡被磨斷後，即無法穿鼻。

(三)結核病和布氏桿菌病(流行病)是本省法定傳染病。目前布氏桿菌疫苗還在試驗階段，結核病無疫苗應用。為防干擾檢疫判讀，結核病疫苗也不應使用。

牛流行性感官和牛病毒性下痢，本省尚無疫苗供應。

(四)果園下可間作山珠豆，作為牧草放牧。

(五)山坡地坡度二十五度以下，可行放牧，太陡的山坡地，不適放牧。每二萬公斤的山地牧草，可養大牛一頭。

(六)以彰化、台中附近來說，公乳犢牛的價錢，生後一周約值四百至五百元，一個月後即在一千元左右。(么樹誠)

原料自日本進口

最好綠 NO.2

施用<1號最好綠鳳梨花芽分化劑>每株鳳梨皆成果實。
 <2號最好綠>促使農作物迅速茁長成熟之最佳植物營養劑。
 <3號最好綠>促進鳳梨果實肥大加速生長。

另有日本原裝 進口500c.c

興達化工廠出品

CSG

台灣省政府農林廳登記
 農肥字第〇一三一號
 通用農作物：
 果樹類 蔬菜 水稻 香蕉
 一〇〇〇倍
 瓜類 花卉
 二〇〇〇倍

凡購買本公司產品當場贈送高級內衣一件

BEST GREEN