

襲，大規模的栽培，在沒有天然的防風條件下，應作人工防風設備，在園地的四周，種植如木麻黃、長枝竹、刺竹等，每一公尺植一株。

同種寬距栽植

栽培距離，通常以同品種、同區寬距栽植較好，一般在三、五英尺左右，在夏威夷以十二—十二英尺的株行距，據說可以減少風害，在本省株行距以六至七公尺為宜。

間作短期作物

栽培期間可選短期作物如蔬菜、鳳梨或其他作物間作，以增加收入。實生苗定植一年後，如發育正常，即可嫁接優良品種，經過四年即可結果，六年後才有收穫，因此栽培這種果樹，應作長期打算，抱定決心，才能成功。

修剪促進發育

定植初期應酌加修剪，可促進發育，樹頂高達二呎半時，頂端即宜剪短，使其分枝多，向四方發展，植株發育平均，便於管理，同時可增加產量減少風害。

幼株施肥次數多

普通與一般的果樹施肥相同，但為使它生產長旺盛，提高產量，在幼株時，施肥次數要多，氮素肥料也應較多。

成株春季開花時作第一次施肥，氮、磷、鉀的比率為二：八：一二，夏季五、六月作第二次施肥，肥分比率為一二：一二：一二，磷、鉀應與氮相等，可使果子亮澤，種仁油分增加，色澤好，香味濃，同時可增加果子重量。

十、十一月果子採收後作第三次施肥，以堆肥與三要素同時施下，肥料的成分比率為一二：一六：一二，可增加產量（磷肥增加），然以上的施肥量，仍看樹齡及發育情形而定。

雨後適當培土

澳洲胡桃因是淺根性熱帶果樹，每到雨季大雨

過後，表土被雨水沖失，山坡地更厲害。因此每次雨後，應作適當的培土，以保持根部健全，並可促進發育及預防倒伏。

蜜蜂協助授粉

澳洲胡桃屬於山龍眼科，是異花授粉，因此在春季開花時期，須在附近安置蜂羣，花的柱頭上有蜜源，可藉蜜蜂採蜜時幫助授粉，增加結果率及產量。

注意防治病蟲

澳洲胡桃抗病虫害特強，受害不大，一年噴藥一至二次即可。春季萌芽開新葉時毛虫及蚜虫為害較多，噴「地特靈」一八·五%乳劑三百至五百倍

養豬利益如何獲得保障？

——家畜保險二九次有獎徵答

徵答問題

(1) 養豬能够得到利益、得到保障，最好的辦法是參加什麼？

(2) 綜合性養豬計畫內所飼養豬隻，依照規定應否加入保險？

險？

(3) 那些家畜可以加入保險？

(4) 未接受政府預防疾病注射豬隻可否投保？

起訖日期：自即日起至十月三十一日截止（郵戳為憑）。
應徵條件：限投保農戶一人一張。

投遞方法及送達處所：徵答問題的答案，應按題目順序書寫於明信片上，並註明本人姓名、

或「馬拉松」一千倍。七、八月雨季時再噴一次，同時這段期間易發生銹病，再噴三式波爾多液即可消除。其他病害雖有，但影響不大。

果實成熟落地

果實成熟期在九、十月間，採收果實，必須待於樹上充分成熟時，否則種仁易發霉，有碍儲藏，不能食用。如充分成熟時，果實可自落地上，採收省工又方便。

果實脫出外殼後，剩下種壳與種仁，再利用脫壳機脫壳，可得完整的種仁，曬乾密封真空罐中，避免光熱，可保持良好的香味與油分。

破碎的種仁或小粒，可供製糖果、冰其淋原料用。在澳洲炒熟加鹽可供食用，風味很好。

即交各屬縣市農會家畜保險部主任負責轉發，並將名單於「豐年」上發表。

再者，第二十八次有獎徵答得獎名單如下：

一等獎：蔡清仁（南投縣中寮鄉），獨得價值三〇〇〇元之電扇一台。

二等獎：莊萬發（南投縣中寮鄉），獨得價值二〇〇〇元之電晶體收音機一台。

三等獎：黃顯陞（高雄縣永安鄉），獨得價值一〇〇〇元之光桌燈一台。

等外獎（二〇名）：莊權字、程珠、程哲郎、程用、洪文池、張新洲、張即、田分、廖大騰、莊祿、何朝枝、張安（南投縣中寮鄉）、黃昆雄、黃讚、湯忠

、吳潭水、許正雄、鄧先濟、張倦、李馬（高雄縣永安鄉），各得價值二〇元汗衫一件。