

油菜台中選2號

多株·密植·直播

栽培法

楊景期

油菜新品種「台中選二號」，不需育苗移植，可以直播栽培，節省苗圃用地和勞力，產量又比「台中選一號」或「新竹特一號」高，很值得推廣。有興趣的農友們，可向彰化縣竹塘鄉農會洽購種子。

油菜是很耐肥的作物，適合本省中南部水田冬季種植。過去推廣時，因「台中選一號」和「新竹特一號」種子產量比在來種增加很多，因此推廣面積曾達到二萬餘公頃，後因油菜種子價格低落，並且這兩品種因須採用育苗移栽方法栽培，生育期間較長，稍會影響第一期水稻插秧期，又由於育苗所需的苗圃用地缺乏和農村勞力不足，因而栽培面積逐年減少。

水稻收穫後下種

為提高油菜種子產量，播種期應愈早愈好，但早播者可疏播，晚播時必須密播。

因於水稻收穫後採用直播法播種，所以第二期水稻最好採用台中一八六號等早熟品種。但為配合目前輪作制度，通常「台中選二號」的多株密植直播栽培，播種時期為十月下旬至十一月上旬為宜，如播種時期過遲，會影響油菜種子產量。

適合冬季裡作

台中區農業改良場多年研究，育成中熟油菜品種「台中選二號」，並以多株密植直播法栽培結果，可節省育苗所用的苗圃用地，亦可省去移植、培土、除草等勞力，同時可避免因移植所引起的生育中斷。又直播栽培時油菜根部可伸入土壤深處，為裡作水利條件差地區的較抗旱作物。

又因採取多株密植法，每十公畝栽植株數可由三、五〇〇株至四、〇〇〇株，提高到二十萬株之多，可減

雜草發生和施肥問題而告失敗，本直播栽培方法特別注意到這二項問題。多株密植直播法為避免糊仔播法的缺點，並節省人工，直播點播播種須在第二期水稻收穫後舉行。播種方法是將水稻收割後的稻草全部均勻撒布在田面上，然後殺草，灌漑後排水，視土壤水分適當時，在每一稻株南邊挖一植穴約半公分深，每一植穴下種油菜種子六粒至十粒，然後覆蓋腐熟堆肥，保持水分，促進種子發芽。

北市農藥字第0782號

霉敵 340

MERTECT* 340

(水果之新防腐劑：TBZ)

霉敵 340 (腐絕) 可濕性粉是為：水果採收、運銷前及貯藏前防腐處理的良劑：新的水果防腐劑——


霉敵 340 (腐絕) 可濕性粉，此劑已經美國EPA(FDA)，核准其殘留容許量，經濟部植物保護技術審議委員會審定使用通過在案。

香蕉：用途：香蕉軸腐病



用法：1. 將霉敵340 (腐絕) 可濕性粉稀釋至250倍之懸浮液，使用毛刷將藥液塗擦於果軸切口部份。
2. 將霉敵340 (腐絕) 稀釋至2000倍之懸浮液，把香蕉浸入此液中二至四分鐘。

柑桔類：用途：綠黴病、蒂腐病等柑橘果實腐敗病。



用法：將霉敵340 (腐絕) 可濕性粉稀釋至500倍，把果實浸漬在此藥液中三至四分鐘，加明礬0.5%可提高藥效，必要時可在果實採收前四天噴射一千倍稀釋液。

霉敵340 (腐絕) 可濕性粉
確保水果新鮮！ 提高經濟價值！



*註冊商標

美商默沙東 (默克) 藥廠

出品

台灣總代理：新

美

公

司

台北市中山北路二段96號

嘉新大樓902室

電話：518348·548873