

因密植，開花期特別早，約在下種後四十至五十天左右就可開花，因此灌溉和追肥工作，通常在種子發芽後視土壤水分情形每隔七至十天灌溉一次，並在排水後即施追肥，提高肥效。

追肥看幼苗生長情形分次施用。施肥法為在下種前每分地施用基肥硫酸銨二十公斤外，第一次追肥以每分地硫酸銨十三公斤、過磷酸鈣十五公斤、氯化鉀十二公斤混合使用。

第二次、第三次追肥每次各施用硫酸銨十三、五公斤。三次的追肥均應在開花前施用完畢。

多株密植栽培，種子發芽後不另舉行間拔，以一株多株的方法管理，每株株分枝少，以促進早期開花，縮短生育日數。且由於油菜生育期間不舉行除草和培土等工作，可節省勞力不少。

及早防治病蟲

油菜生育期間常受蚜蟲侵害，若於開花結實期被害，將影響種子的結實，減少產量，更要注意早期防治。蚜蟲用四〇%「聚米松」乳劑或「殺力松」乳劑一千倍液防治。

油菜生育中後期常受小菜蛾為害，影響種子產量，可用「蘇力菌液劑」(每公克含三百億孢子單位)的一千倍稀釋液每隔十天噴藥一次防治，但本劑是遲效性藥劑，用藥後二天才能見效。

細菌性黑斑病是油菜的主要病害，此病在生長後期發生，為害植株的莖部、葉部，起先發生水浸狀小斑點，逐漸轉為紫黑色條狀斑紋，後來變黑褐色。應由無病株採種，並在抽苔後噴射「大生」四百倍，或六八斗

式波爾多液預防。田間如果發現病株，要立即小心拔除燒掉，以防傳播病原菌。

一二〇天收穫

油菜莢果成熟時，會自動裂莢散種子，因此不可等到全株黃熟時才收穫。

一般在植株基部二分之一高度的莢果黃熟時就收穫。正常管理下，台中選二號播種後四〇—五〇天就開花，一二〇天—一三〇天就可收穫。最好在上午十點鐘以前或傍晚無陽光直射時，用鐮刀由地面上收割，提防細土塵埃雜物混入。

收穫後放在晒場乾燥，並用鏈枷在晒場打拍莢果，使莢果開裂，種子脫出。

種子須充分乾燥，並防泥沙或莢壳摻雜。乾燥標準以含水量不超過一〇%為度。愈乾燥品質愈好，水分太多時不耐儲藏，且影響種子油品質。

供應優良種子

油菜是十字花科植物，容易和同科的其他菜類雜交，因此必須隔離採種或套袋留種，才可保持品種的純度。一般農友大都沒有這種設備，請每年向當地農會購買由採種圃生產的種子，以保種子純良。切勿自己任意留種。

今年油菜種子「台中選二號」，由農林廳委託彰化縣竹塘鄉農會精選包裝完畢，自即日起開始供應，每包七〇〇公分裝，約一分地播種用，售價新台幣二十元。一次購買七〇〇公斤以上的，運費由竹塘農會負擔。現播種期快到，需要種子的農友，請透過當地鄉鎮農會向竹塘鄉農會購買。

台灣肥料公司榮譽出品



農友牌複合肥料

就是氮、磷、鉀三要素完全肥料
多種配方，適合各種作物施用

四大特點

價格低廉
肥效良好
不必攪拌
不易流失

台灣肥料股份有限公司
地址：台北市延平南路一〇一號
電話：三三九二(二十線)

本公司員林營業所
地址：員林鎮中山路二二一號
電話：一七六一號