

蜆

煮湯、生吃都可以，未來的消費量很大！

余廷基

蓄水養殖

本省養蜆有二種型態

蜆（喇仔）肉味清爽，小型的作湯，大型的浸調味料後生吃，都深受大眾的歡迎。

過去本省各地的小河和灌排水圳都有蜆棲息，近年來由於農田普遍施用農藥，灌排水圳又時常枯渴，以致產量顯著減少。相反的由於人口增加，消費量也增加，以致有供不應求的現象發生，因而養殖者一年比一年增加。

本省的蜆有三種

本省的蜆，有台灣蜆、大蜆和花蜆三種，其中

目前本省普遍養殖的是台灣蜆，大型的寬長可

晒一至三星期後灌水。放養量依池塘和水圳的環境

。一種是利用整條灌漑水圳養殖，多在彰化縣福興鄉一帶採用，藉水的流動，供給餌料，不必人工投餌，成效很好。

另一種利用灌漑蓄水池養殖，多在新竹和桃園縣一帶採用，由於水的流動不如水圳迅速，所以必須人工投餌，補充天然餌料的不足。

養蜆的土質，沙粒最好，廢泥最差，水深以一至一·二公尺最為適宜。

池底高低不平，且池水過深時，容易發生營養不良，成長就不好。

蜆苗應選擇壳高肥滿的。放養前，先將池底曝

光，表示浮游生物和藻類缺乏，應投放豆餅、米糠、麵粉粕、雞糞、水肥或化學肥料等作為追肥，繁殖浮游生物和藻類。餌料不足時，蜆壳雖長大，但肉量却很少。相反的，池水過肥時，可能因水中缺乏氧氣，使蜆死亡。

一般養殖五至六個月，就可以開始間捕收成。間捕方法是以鐵耙（上圖）為工具，用人帶動撈捕，捕上後用孔徑一·五公分的鐵篩，篩選大型的出售，小型的隨即放回池中，繼續養殖。


在蓄水池養蜆，多混養大頭鰱、白鰱和草魚等，成績都很好。

防止鯉魚為害

蜆主要的害敵是鯉魚，鯉魚捕食蜆最兇。蚌會妨礙蜆的生長，也應注意清除。

疾病有俗稱「臭頭」的，先是蜆壳由原來的黃色，逐漸轉變為黑色，進而壳頂顏色脫落，露出石灰質，終於穿孔死亡，以養殖期間長的為嚴重，可能因土質缺乏某種成分所引起。

據某養殖者說，在十一月間體型八公厘至一公分的變黑且發生「臭頭」，立即投入打碎豆餅，每公頃七塊，至翌年二月間檢視結果，不但已轉為黃色，成長尤佳，達一·二至一·五公分。我認為這種疾病是蜆衰老的現象，如能充分供應養分，防止衰老，並適時捕售，就能避免。



上：捕蜆。下：捕蜆耙

達四三×三八公厘，外形接近正三角形，齒丘面較廣，斑紋細密，肉肥，味美。

大蜆是本省的特產，大型，長七五公厘，高六五公厘，寬三五公厘，前端部圓，後端延長，稍呈切直狀，壳頂高，壳皮幼

者呈黃色，長成者呈漆黑色，壳內面帶黃肉色，窩心部呈白色，蝶線很顯著

，有三個主齒，齒丘狹並具細密紋刻，前後側齒略同大，刻口微淺。

台灣蜆是雌雄異體的

卵生種。蜆的生長很慢，一般供養殖的蜆苗，小型的自孵出已經過三至四個月，大型的已經過四至五個月以上。

而異，一般按每坪〇·五至一公斤蜆苗的密度放養，不能過密，否則成長不佳。

目前蜆苗價格，體型二至三公厘的每公斤八至九元，四至五公厘的每公斤十至十一元，可向彰化縣鹿港鎮頂番婆和桃園縣觀音鄉購買天然產幼貝，每年多在三至四月間放養，放養時把整袋蜆苗放在竹筏上，均勻散布於池中。

約半年後採收