



芥菜・辣椒

〔問〕：(一)芥菜：(2)種植適期在何時？在其他季節是否也可以種植？(我希望能全年種植，供應加工之用)
 (3)請問如何播種、中耕、施肥和灌溉？
 (4)低濕地是否適宜種植？
 (5)有何病虫害？如何防治？
 (6)盛產期在何時，每分地全年產量約多少？
 (7)成熱(顏色不變紅者)辣椒晒乾後，應如何儲存才不會被虫蛀食？
 (8)我想利用已種植枇杷和水梨樹苗的空地，種植辣椒和芥菜。目前國內有那一種除草劑對辣椒、芥菜、水梨和枇杷施用而無藥害？(新竹市金城一路九巷一二九號楊徽青)

〔答〕：(一)芥菜：
 (1)肉甲、包心(雞心薺)及雪裡紅三種。

(2)聽說有三種不同品種，是那三種？
 (2)種植適期在何時？在其他季節是否也可以種植？(我希望能全年種植，供應加工之用)
 (3)請問如何播種、中耕、施肥和灌溉？
 (4)低濕地是否適宜種植？
 (5)有何病虫害？如何防治？
 (6)盛產期在何時，每分地全年產量約多少？
 (7)成熱(顏色不變紅者)辣椒晒乾後，應如何儲存才不會被虫蛀食？
 (8)我想利用已種植枇杷和水梨樹苗的空地，種植辣椒和芥菜。目前國內有那一種除草劑對辣椒、芥菜、水梨和枇杷施用而無藥害？(新竹市金城一路九巷一二九號楊徽青)

〔答〕：(一)芥菜：
 (1)肉甲、包心(雞心薺)及雪裡紅三種。

(2)十月中、下旬為播種適期。
 (3)芥菜需要施用堆肥，否則生育差，播種床應設法施用堆肥或燒土。每十公畝的施肥量如下：
 硫酸銨——六十公斤或尿素三十公斤。
 過磷酸鈣——五十至六十公斤(作為基肥)。
 氯化鉀——三三至三十六公斤。
 保持土壤水分(含水量)——五五至六五%。
 (4)病虫害防治，與其他十字花科相同。
 (6)低濕地不宜種植。
 (一)辣椒：
 (1)生育適溫在攝氏二十至二十五度間，攝氏十五度以下就停止發育，但攝氏十至十五度仍能着果。辣椒如遇下霜，就發生霜害。是否能全年生長，需視當地氣候條件而定，一般一至二年更新一次。
 (2)沒有堆肥，它的生育就差，除非土壤本身含有多量的腐植質(指五至八十%的腐植)。十公畝施肥量如下：
 硫酸銨——八十至九十公斤
 過磷酸鈣——六五至七五公斤(分四至五次施用)
 氯化鉀——三五至四十公斤
 播種適期八月下旬——十月中旬。
 (3)土壤水分，保持土壤含水量五至六十%。
 每次灌溉水量約八至十公分。
 (4)低濕地不宜種植。
 (6)十公畝的產量在四——六千公斤

，種植後七五天以上可達到盛產期。
 (6)病虫害防治與番茄相同。
 (7)乾果的儲存，宜定期翻晒，以防蛀食。
 (二)辣椒及芥菜宜噴射「拉草」除草劑，每十公畝一二〇西西，加水一〇〇——一二〇公斤。(王進生)

小牛飼料

〔問〕：(一)生後一星期的乳公牛，可否用脫脂奶粉或人工奶飼養？
 (二)小牛一天需奶粉量多少？分幾次餵飼？稀釋幾倍？溫度多少？飼養多久斷乳？斷乳後如何管理？(高雄仁武鄉仁武村長春巷一八號高貞志)

〔答〕：生後一周的乳公牛，可用人工奶或脫脂奶粉飼養，但是脫脂奶粉價格較高，完全用脫脂奶粉飼養不一定合算。

(一)一般的養法，用一半脫脂奶粉，另加適量的魚粉(約四%)、維他命、糖(七至八%)、塩(〇·六%)、大豆餅粉、甘薯粉、小麥粉、礦物質等混合均勻。以七——八分水與一分脫脂奶粉混合，調合成乳汁狀餵養。最好是逐步取代鮮奶，二周以後才完全餵飼這種脫脂奶粉混合物。
 每天的餵給量，以小牛體重的十分之一為宜。例如四五公斤小牛，餵調好的液狀飼料四·五公斤，可以分為早晚二次，溫度與牛的體溫相近即可，可以一直餵到小牛體重達到八十多公斤。
 開始餵飼十日以後，可放些乾草或青草，任小牛自由採食。
 如能買到乳牛混合飼料，也可以在十四日以後，供應少量使練習採食。(公樹誠)

請認明商標購用
新和各項優良種子

- 藤田新製大五寸人參，紅心五寸人參，新黑田五寸人參，綠寶甘藍等。
- 長岡交配早秋甘藍、六〇日甘藍，初秋甘藍、結球白菜等。
- 新和交配西瓜、洋香瓜、甜瓜、胡瓜、南瓜、長茄、花椰菜、結球白菜、甜椒其他優良品種。歡迎賜顧。

銷 經 總
 行 子 種 和 新

通 地 址：嘉義市西門街三號
 郵 政 箱 號：三九三號
 電 話：3479