

養鴨

唐清岑

本省河流交錯，除於河流沿岸養有大羣鴨子外，農村副業養鴨，每戶三隻、五隻至二十隻不等。全省約有鴨一千萬隻以上，市面上蛋製品如皮蛋、鹹蛋、蛋糕等全是菜鴨蛋的加工品。鹹板鴨、端午節、中秋節大量應市的鴨肉，則是土番鴨或改良土番鴨。每年冬至進補的正番公鴨及本省著名的常歸鴨更少不了鴨子。


畜牧綜合經營

以前本省養鴨分布於彰化、台北、桃園各縣，目前除宜蘭地區有大規模飼養外，雲林、嘉義、屏東等地區也飼養不少。

最近幾年來高雄縣湖內鄉、茄萣鄉及路竹鄉等地區如雨後春筍般，大家紛紛將低等則的旱田開闢為魚塢兼養鴨子，魚牧綜合經營，農民於魚塢內飼養吳郭魚、草魚等，並在魚塢中架築鴨棚，以玉米、豆餅、小麥及雜魚養鴨子，鴨糞直接落入魚塢供做魚的餌料，既可節省鴨棚的清理工資，又可減輕養魚的成本，為本省養鴨開闢新途徑。

養鴨育種改良

農復會為改良本省鴨的品質與繁殖能力，曾於四十三年及五十二年連續引進北京鴨及陸地鴨種蛋，交新化畜產試驗所及高雄區農業改良場孵化飼養、繁殖、推廣。



並為提高產蛋鴨品質，自五十二年起在宜蘭縣設置示範養鴨選種

農戶，進行選種，繁殖優良系統種菜鴨，推廣農村飼養。接着又在宜蘭成立養鴨育種中心，改良鴨種，發展本省養鴨事業。

本省鴨子四種

- (1) 正番鴨：有白色、黑色兩品系。正番公鴨專與母菜鴨雜交生產種蛋，孵化土番鴨，各地肉鴨繁殖場都以一比十二飼養。母正番鴨有就巢性，担负起副業養鴨者自然孵化的重任。
- (2) 菜鴨：佔本省養鴨數的大半，飼養目的為產卵，一為與正番公鴨雜交繁殖肉用土番鴨。



雨中趕鴨

- (3) 土番鴨：為公番鴨與母菜鴨的雜交種，不能產卵與繁殖，專供食用，早熟易肥，抵抗力強，肉味佳，是很好的肉用鴨。
- (4) 北京鴨：卵肉兼用種，四個月可達三公斤。體大食量驚人，鴨農多不願飼養，目前除宜蘭養鴨育種中心外，不易找到純種的北京鴨，在農村中可找到與菜鴨交配所生的雜種。又此雜種母鴨與正番公鴨配種生產的三品種鴨，即是最受歡迎的改良土番鴨。

人工大量孵化

飼養小鴨羣的農友，可用母番鴨或火雞自然孵化，每隻可孵十五至十八枚，孵卵箱箱底墊好稻草，放在能防風雨、日晒的陰涼清靜地方，孵化期需二十八日。孵化期中當母鴨到窩外活動時，應隨時供給充足的飼料和飲水，在孵化第五天及十四天時，應檢除未受精卵或中止卵。若大量孵化，可委託鴨場代為人工孵化。

初生小鴨體內卵黃吸收比雞快，孵化後二十小時就開始給銀飼料。子鴨的育雛法與雞相似，羽毛乾後即可飼餵，當氣溫低時需保溫一、二周，夜晚應注意子鴨的聚堆。天氣較暖及小鴨漸長，均應以木板隔開，控制聚堆的數目，以防子鴨堆積時遭受管理不善的損失。

供給平衡飼料

天氣晴和時，鴨子食過後即可放入水池任它游泳，子鴨應經常供給清潔的飲水，並保持飼養環境的乾燥衛生，時常更換墊料及供給平衡的飼料。現列一配方如下表，供農友們參考：

	魚粉	豆粉	脫脂米糠	麸皮	碎麥	小麥	大麥	骨粉	甘藷
4周以前	8	20	10	10	18	33	1		
4~9周	5	15	20	10	12	7	1		30

飼料給與次數，初生小鴨每日五至六次，三周後每天三次即可。為節省飼料費，自第二周開始，應逐漸增加青料，由五成漸增，直至八周後即可保持四〇%。

蛋鴨雜食，比雞還粗放，凡是水中的浮萍、農產物的碎屑、河流的魚貝都可飼餵。沿海地區更可以雜魚代替魚粉，減低飼養成本。

留種用的正番鴨及北京鴨，八周齡時應選體型較大、活潑、健康且比較安靜溫馴的留種。種用鴨十六周時應再檢查一次，四至五月齡時再選一次，等到六至七月齡時再作最後的選擇。

開始飼養前宜多訪問當地養得最多及成功的農友，因鴨種的優良與否可決定養鴨的成敗。

肉用鴨的飼養

(1) 從有信用的養鴨場選購子鴨，以胸部寬廣，腹深背潤者為佳。鴨舍應位於給水、排水及通風良好、交通便利、便於運輸飼料及肉鴨的地方。

(2) 應實施家禽霍亂的預防注射。

(3) 有效管制飼料供飼的平衡，以粗蛋白一六%，熱能九〇〇卡路里最好。

(4) 採取全進全出，鴨舍在鴨子出售後至少要空二周徹底消毒。

(5) 市場價格變化大，在最有利益重時（九至十周約達二公斤）出售。

(6) 詳加紀錄收支情形，以供改進的參考。
肉用鴨的飼料配合例：

黃玉米30%，米糠20%，糙米22%，青飼料15%，雜魚10%，脫脂奶粉3%。

卵用鴨的飼養

(1) 選鴨身長、胸骨與恥骨間距離寬者較好，通常鴨身長產卵多。

(2) 鴨大半在黎明時產卵，早晨收卵後，於九時後才放飼。

(3) 管理員應隨時保持場地的乾燥、衛生，並力求環境的空氣流通，陽光充足。因鴨常會受外界的吵雜而影響產卵。

(4) 保持鴨舍的清潔衛生，舍內的墊草應常更換，經常供應清潔的水。

卵用鴨飼料配合例：

黃玉米45%，脫脂米糠20%，麥麸11%，大豆餅10%，牧草粉5%，魚粉5%，骨粉1%，蚶壳3%。

注意疾病防治

預防勝於治療，隨時注意水質，保持飼槽、飲水器及養鴨環境的清淨，並定期實施家禽霍亂預防注射，遇有病鴨時應立即隔離治療。

家禽霍亂：使用霍亂菌苗可得六個月免疫，發病時可用金微素與菌苗混合注射（每一〇〇CC菌苗加一五克金微素）。

軟腳病：飼料中多給骨粉、牡蠣，且讓鴨子多運動及曬陽光。

寄生蟲：小鴨使用半片驅蟲藥，大鴨用一片或於飼料中填加匹配朗粉可收驅蟲的效果。

食物中毒：用維他命K、B注射解毒，鴨子放飼時最好在上流地域，隨時注意水源的清淨。



臺灣肥料股份有限公司出品

業務接洽處：台北市延平南路一〇一號

（承銷商名單備索）

電話：三三九六（十線）
電報掛號：五一四一台北

肥効顯著
施用方便

尿素 香蕉肥料

硫酸銨 甘蔗肥料

過磷酸鈣 柑桔肥料

硝酸銨鈣 瓜果肥料

磷酸銨 花卉肥料

蔬菜肥料

歡迎採用
成份保證

電石氣

氟矽酸鈉 氫氣

電極 乙炔 黑膏

液氨 石灰石

液氨 水塊 石灰

液氨 氮塊 石灰

液氨 氮塊 石灰

液氨 氮塊 石灰

液氨 氮塊 石灰

液氨 氮塊 石灰

主要產品

次要產品