

飼料給與次數，初生小鴨每日五至六次，三周後每天三次即可。為節省飼料費，自第二周開始，應逐漸增加青料，由五成漸增，直至八周後即可保持四〇%。

蛋鴨雜食，比雞還粗放，凡是水中的浮萍、農產物的碎屑、河流的魚貝都可飼餵。沿海地區更可以雜魚代替魚粉，減低飼養成本。

留種用的正番鴨及北京鴨，八周齡時應選體型較大、活潑、健康且比較安靜溫馴的留種。種用鴨十六周時應再檢查一次，四至五月齡時再選一次，等到六至七月齡時再作最後的選擇。

開始飼養前宜多訪問當地養得最多及成功的農友，因鴨種的優良與否可決定養鴨的成敗。

肉用鴨的飼養

(1) 從有信用的養鴨場選購子鴨，以胸部寬廣，腹深背潤者為佳。鴨舍應位於給水、排水及通風良好、交通便利、便於運輸飼料及肉鴨的地方。

(2) 應實施家禽霍亂的預防注射。

(3) 有效管制飼料供飼的平衡，以粗蛋白一六%，熱能九〇〇卡路里最好。

(4) 採取全進全出，鴨舍在鴨子出售後至少要空二周徹底消毒。

(5) 市場價格變化大，在最有利益重時（九至十周約達二公斤）出售。

(6) 詳加紀錄收支情形，以供改進的參考。
肉用鴨的飼料配合例：

黃玉米30%，米糠20%，糙米22%，青飼料15%，雜魚10%，脫脂奶粉3%。

卵用鴨的飼養

(1) 選鴨身長、胸骨與恥骨間距離寬者較好，通常鴨身長產卵多。

(2) 鴨大半在黎明時產卵，早晨收卵後，於九時後才放飼。

(3) 管理員應隨時保持場地的乾燥、衛生，並力求環境的空氣流通，陽光充足。因鴨常會受外界的吵雜而影響產卵。

(4) 保持鴨舍的清潔衛生，舍內的墊草應常更換，經常供應清潔的水。

卵用鴨飼料配合例：

黃玉米45%，脫脂米糠20%，麥麸11%，大豆餅10%，牧草粉5%，魚粉5%，骨粉1%，蚶壳3%。

注意疾病防治

預防勝於治療，隨時注意水質，保持飼槽、飲水器及養鴨環境的清淨，並定期實施家禽霍亂預防注射，遇有病鴨時應立即隔離治療。

家禽霍亂：使用霍亂菌苗可得六個月免疫，發病時可用金徽素與菌苗混合注射（每一〇〇〇C C菌苗加一五克金徽素）。

軟脚病：飼料中多給骨粉、牡蠣，且讓鴨子多運動及曬陽光。

寄生蟲：小鴨使用半片驅蟲藥，大鴨用一片或於飼料中填加匹配朗粉可收驅蟲的效果。

食物中毒：用維他命K、B注射解毒，鴨子放飼時最好在上流地域，隨時注意水源的清淨。



農友牌

肥効顯著
施用方便

尿素 香蕉肥料

硫酸銹 甘蔗肥料

過磷酸鈣 柑桔肥料

硝酸銹鈣 瓜果肥料

磷酸銹 花卉肥料

蔬菜肥料

臺灣肥料股份有限公司出品

業務接洽處：台北市延平南路一〇號

電話：二七九六（承銷商名單備索）

電報掛號：五一四一台北

歡迎採用
成份保證

電石氫氣

電極乙炔黑

液氨水

液氨水

液氨水

液氨水

液氨水

液氨水

氣磷酸

主要產品

次要產品