

# 母豬常易發生的疾病

邱敏霖

飼養母豬最大的目的是多生健康的子豬，育成後出售多賺錢。但母豬在  
日常管理中，常易發生各種疾病，尤其是生殖器的疾病，如不隨時注意觀察  
，適時防治，必使母豬死亡。

## 將發性流產突然發生

(一)發生原因：飼養管理不宜，如熱天餵發酵或發霉變質飼料，冬天餵過  
冷的水，或由於母豬驚嚇跳越障礙物，及長途運輸，腹部受壓迫、打傷。此  
外，生理異常如卵巢機能發育不全，黃體質爾不足或卵巢早期萎縮，胎兒  
畸形，臍帶捻轉，胎盤形成不全，胎兒死亡，也能引起這種病症。

(二)症狀：母豬在懷孕初期較易流產，患豬突然流產，事前沒有明顯的症  
狀。流產後外陰部稍為紅腫，有粘液，尾根部附着不潔粘液，有此情形，就  
可判定是流產症。如能早察覺，在豬舍內可發現流產的胎兒及排出的附屬物  
體。如察覺太遲，流產的胎兒就會被母豬吞食。

流產後的母豬，有的食慾正常，並無異狀，但有的精神萎靡，倒臥一角  
，食慾不振，毛直立，全身痠癢，體溫上升。也有根本沒有陣痛分娩現象，  
如胎死腹中者，往往在腹中因受胎位變化或死胎變化，如腫大，皮膚脫離，  
關節離斷，手術時無法取出死胎。

(三)防治方法：注意日常飼養管理，已經發生流產的母豬，外陰部及產道，應即用「來蘇  
兒溶液」洗滌消毒，子宮內用千分之一高錳酸鉀溶液洗滌，以免細菌感染，發炎化膿。

母豬再度發情時，應即配種，就可受胎。症狀較嚴重者，存留於子宮內的死胎，應手術  
取出。如一時無法取出，需用生理食鹽水洗滌子宮及陰道，使死胎慢慢溶化，就可洗出不潔  
的溶化物汁，但需繼續數星期治療才能痊癒。肌肉注射消炎劑。

## 陰脫可能成為習慣性

(一)發生原因：(一)陰部粘膜露出陰門外呈赤黑色叫做陰脫。年齡較老的母豬，營養不良，  
長期舍飼，運動不足；或環境不清潔，劣性遺傳，長途運搬疲勞，豬舍地面太傾斜，長期餵  
食太粗的飼料，腹腔被壓迫，都能引起陰脫。多在懷孕後期或分娩後再發情時，影響母豬繁  
殖生理。

(二)症狀：母豬將近分娩時較易陰脫，暴露外陰部後，因接觸舍內牆壁及地面糞尿，容易  
損傷陰粘膜，引起炎症，腫大出血(約有嬰兒頭樣大)，致陰部無法收縮還元回復原部位，  
陰粘膜糜爛或乾燥破裂流出血液，影響畜體健康很大。症狀較輕時，分娩後陰部可自然恢復  
原位，但亦有已收縮還元後到發情時又再脫出外陰部，成為習慣性陰脫。

(三)防治方法：輕症的陰脫，會自然收縮原位。日常飼養管理，應注意改善營養，給予蛋  
白質較豐富的飼料，及充分的運動。在分娩前盡量避免損傷陰部，並保持清潔。陰脫後發炎  
較重者，粘膜需消毒，普通用二多明藥水洗滌，然後輕壓陰的前端，助其收縮，回復原位。  
同時內服「抱木苦露拉兒」或肌肉注射消炎劑。較為頑固而成習慣性的陰脫，可用縫合針線  
在陰門部縫二至三針，以防止再度脫出。



沙灘河(左上三個)和吊河比較

失很大，所以最好使用防  
腐蚧架。  
經過防腐處理的蚧架  
，可耐用六年以上，不但  
產量可靠，且所節省的材料  
和架立工資(吊蚧的架  
立工資很多)，可以減輕  
大量生產成本。茲將防腐  
蚧架和普通蚧架的成本比  
較如下表。

### 防腐蚧架和普通蚧架的成本比較

(1棚, 120坪)

	材料	防腐	每年架 立工資	合計	耐用	年負擔 (元)
防腐架	4,920	1,365	1,000	7,285	6年 以上	1,212
普通架	4,920	—	1,000	5,920	1年	5,920