



茶花栽培

〔問〕：(一)目前本省常見的茶花有幾種？

(二)茶花病蟲害如何防治？

(三)如何使茶花母樹發育良好(花多而大)？

(四)據說茶花的花蕾不能以手觸摸，請問是否正確？

(五)盆栽茶花，可否終年放置陰涼處？(但夜晚則露天)

(六)防治蟲害時(如噴農藥)，是否會影響花苞的成長？(台南南化鄉小崙村一一九號陳文標)

〔答〕：(一)目前本省常見的茶花有：紅牡丹、荔枝茶、廣東粉、白六角、紅六角、粉牡丹、白牡丹、五寶、七巧、九面、十八學士及紅白茶梅等品種。

(二)預防茶花病害，每月需噴撒五百倍大生(各式)稀釋液一次。治療時，每周噴撒四百倍大生一次。

一般蟲害預防，噴撒一、五〇〇倍的馬拉松稀釋液，每月一次，治療時每周噴撒一千倍的馬拉松一次。介壳蟲需噴撒馬拉松乳劑稀釋液。一分預防勝於十分治療，預防甚為重要。

(三)要使茶花母樹生育良好，應注意下列各點：

- (1) 不可栽植於大樹下面。
- (2) 應有充分日光照射。
- (3) 栽植周圍必須通風。
- (4) 土壤排水良好。
- (5) 時常中耕除草。
- (6) 夏季乾旱時要常灌水。
- (7) 春秋雨季施用腐熟厩肥或豆餅水兩次。
- (8) 颱風季節應設立支柱，以免根部搖動。
- (9) 花蕾過多時，可摘去一部分，花蕾不太多時開花大。

(十)茶花花蕾輕輕觸及，無礙開花，但不可壓擠而傷到花柄。

(十一)施肥時用環狀施肥法，將根部周圍挖環狀溝，深度以不見根為原則。將腐熟厩肥施入，再覆土灌水即可，施用化學肥料時也相同。

(十二)盆栽茶花不可終年置於陰涼處，必須有適當日光。葉綠素須與日光、二氧化碳、水分才能製造養分，使茶花生長開花。

(十三)噴撒農藥的濃度不過濃時，不影響花苞成長。(呂淑濤)

平地種梨

〔問〕：(一)我栽植橫山梨已有十二年。過去春季雨多，結果不好，近三、四年秋季結果比較好，但是落葉時間却不一定。開花期從立秋到寒露，並不理想，有何方法補救？

(二)據說使用藥劑抑制，會一次落葉，結果也好，是否會影響壽命和隔年生產？(台北土城鄉員林村四一之四號姜坤賢)

〔答〕：(一)橫山梨在平地因氣候

關係，有兩次開花情形。事實上在春季開花，秋季落葉為正常現象；反之秋季開花結果，則為不正常現象。因此時剛好為落葉休眠期，影響幼果發育，唯一補救方法，應迅速加施肥料，以促進新葉萌發。

柑桔流膠病

〔問〕：(一)柑桔樹幹會流出黃色的黏液，這是什麼病？

(二)柑桔落葉，是否和敗根有關係？怎樣防治？(卓蘭鎮新厝里七鄰四九號黃明清)

〔答〕：(一)你的柑桔患的是流膠病，大部分發生在較低濕的柑桔園，防治方法如下：

(1) 盡量避免種植在低濕地方。
(2) 低濕地柑園須開排水溝，並做高畦種植。
(3) 施用充分的肥料，避免修剪工作，使樹勢旺盛。
(4) 患病部分剷除後，塗布石灰糊(多穗十公克與石灰二百公克，加水調成糊狀)。

(二)柑桔落葉現象發生原因很多，如患毒藥病、排水不良、過於乾燥、霜害等。凡是植株的營養吸收組織發生毛病，無法供應養水分至地上部時，則會發生落葉現象，因此如要防治落葉現象，須先研究落葉原因。

如為根部腐爛，該先檢討腐爛原因；如為滯水現象，須改善排水系統；如屬肥料成分過濃，則須換土；在夏天如發生乾燥情形，須予灌水或作覆蓋工作。(翁仁祿)

三季蒔 霸王白菜



本社產品天理交配三季蒔霸王白菜、金力甘藍、大和西瓜、瓜、ニユロメロン、巨豐瓜、ミカサ菠菜等，承受諸商、及農友讚揚，深感同業商、行、今後定更加倍努力研究不負眾望，以報答愛顧之忱。

大和農園

種苗部 敬啓

株式會社