


的芽苗為乳白色，在此時期抵抗力很脆弱，容易遭受風霜侵襲，須加以綠化。白天應放在日光不會直接照射到的地方，如樹蔭下，或上面架一尼龍網蓋，以擋烈日。如遇寒冬，上面應加蓋塑膠布，夜晚搬進溫暖室內或草蓬內。




如此經過三、四天，苗莖轉綠，第二葉長出，便可將尼龍架拆除，而進入硬化期。此後應注意通風及日照，防止鳥害、鼠害及嚴寒的霜害。在綠化及硬化期間，應保持水分適當的供應，如在南部第二期每天須澆水兩次以上，北部第一期施一次便可以。如果所育苗箱數較少，使用洒水壺澆水便可。箱數多時，以田間澆排水較為方便。可將田區鋤平，開澆排水溝。

(右圖) 播秧適期為：第一期作，播種後一五、二〇天。第二期作，播種後八、一二天。

注意事項

(1) 苗箱用木板，不可含大量的油質，如舊電線桿或上塗瀝清等木材製成者。苗箱使用前須先浸水一、二天。



10~20箱

(2) 床土須經長久曝曬，或用福爾馬林液予以消毒，將種子消毒後的藥液加以利用也可以。
 (3) 如果秧苗感染黴菌而造成小部空缺，則使用タチカレン溶液予以消毒(每一箱用五CC)。
 (4) 播種期常遇下雨的地區，採土應提早。以防播種床土處理的困難。
 (5) 硬化期如田間灌水，其水面不得超過木箱上緣，灌水二、三日後就應排水。然後每隔一日，間斷灌溉。下雨時應特別注意排水。
 (6) 野馬KFP二、三〇動力式插秧機，因為苗台規格不同，其苗箱寬為二九公分。同時因為苗取苗寬為一、五分，所以每公頃須要箱數為二〇〇箱，每箱播種量為二五〇克，因此每公頃採土量及肥料量應多準備一些。
 (7) 積溫的算法：每日平均溫度乘浸種日數，例如日常均溫為攝氏二〇度，浸種五日，則積溫為一〇〇度。

務請小心辨別

請認明 **DITHANE* M-45** 商標
大生* 四十五



大生四十五 (DITHANE M-45) 係美國羅門哈斯公司榮獲世界專利之最新廣效性殺菌劑，能有效防治作物莖葉之主要病害，如一葉斑病、黑星病、晚疫病、露菌病、炭疽病及銹病。

大生四十五係鋅離子 (ZINC ION) 與錳乃浦化合物離子之結合成品，並非一般錳乃浦與鋅乃浦的物理性之混合物，因此大生四十五之化學性，物理性和生物性，具有獨特的性質，純係一種最新型的殺菌劑，與鋅乃浦，錳乃浦或是這兩者的混合成品絕對不同。

三磅紙袋原裝 **大生* 四十五 (DITHANE* M-45)**

◎ 說明書函索即寄



美國羅門哈斯公司 出品
 *美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標

現貨供應：民豐化工廠股份有限公司
 台中縣大肚鄉中和村中山路10之6號