

訪廖萬豆農友

談芹菜栽培經驗

廖火山

本省屬於亞熱帶氣候，每年六至九月為雨季，夏天高溫多濕，常有驟雨與颱風。在此時期栽培蔬菜風險很大，且蔬菜的生產與供應往往失去平衡，因此蔬菜價格常不穩定，時跌時漲，如俗語所說：菜金菜土，全靠天時與地利。因此，如能在夏季栽培各種早期蔬菜，供應市場，那麼收益是相當可觀的。

住在二崙鄉三和村十八張墾五十四號廖萬豆農友，他利用第一期稻作收割後，提早栽培芹菜。他已經有三年的栽培經驗，由於管理得法，栽培芹菜的收益超過栽培水稻的三倍以上，使他的家庭經濟完全改觀了。

茲將他栽培芹菜的經驗記述於下，以供各位農友參考。

品種：黃心白骨早芹菜。

園地：芹菜最忌浸水，選擇地勢較高的水田，且保水力強的粘質壤土，並且最近三年內未種過蔬菜為理想的園地。

整地與作畦：當第一期水稻收穫後，立即整地與作畦，畦寬五合尺半，畦溝寬一·二合尺，畦溝深一合尺。畦溝宜深，以便雨後能盡速排水，避免芹菜心腐病的發生。

播種：畦作好後，用水泥管來回輪平，即可播種。用撒播法，播種量宜多。雖然播種量多，將來幼苗很密，間拔費時，但日後生長整齊。如播

疏，需要補植，則生長參差不齊。

播種後宜再用水泥管輪壓一遍。然後覆蓋稻草，待發芽時，就可將稻草拿掉。

搭架蔭棚：搭蔭棚的目的是提早收穫，可較無蔭棚者，提早二十天以上。②可減輕芹菜被雨水沖倒。

③促使莖骨潔白幼嫩，提高品質。棚柱用竹片，其頂端作成凹字形，柱距六至八合尺均可，視草籬大小而定，草籬橫支竹跨在柱的凹處。以便遇有颱風來臨前，將草籬放低，待颱風過後，即將草籬置於原處。作草籬的稻草，必須將草褲去掉。

施肥：整地時就要施用基肥。追肥是三要素混合施用，尿素宜分多次施用。當芹菜植株尚小時，施用稀薄尿水三、四次，效果很好。在苗長三、四合寸時，施三要素要行點施，再施用過篩的堆肥。

病虫害防治：芹菜的蚜虫、潛蠅、青虫等，用五〇%馬拉松乳劑及大滅速乳劑防治即可。炭疽病、心腐病、根腐病等用大生M四五、富米農片劑及紋枯乳劑防治。根腐病為最難防治的病害，必須實行輪作。病株必須拔除燒燬。

管理要點：播種後翌日即可洒水，使土壤保持六〇%至七五%的水分，促進發芽。幼苗間拔兩次，施肥、洒水、噴藥等工作，宜在下午進行。為促進生長，必須噴射荷爾蒙數次。他所噴射的荷爾蒙是多收生長素（アトニツク）及勃激素（奇拔利靈）。

隔年結果！不開花！開花不着果！

本廠為解決貴園的果樹上列三個問題提供技術服務



羽毛牌 酵素混合肥料

農林廳登記：農肥字第096號

◎本廠有各種果樹「營養週期施肥法」說明書備索

特長

- ◎羽毛牌肥料是用羽毛、骨、皮等動物質為原料。吸收均勻肥效可保持四個月以上
- ◎羽毛牌肥料中培養着繁殖力極強的土壤微生物（日本島本微生物會社製品）施入土中後不但能分解本肥，連貴園土壤中所有難吸收有機、無機物質也能分解變為根群可吸收狀態，這些土壤微生物最忠誠而無休止的為顧客工作！

本廠技術服務：本廠附設果樹栽培技術服務中心，聘請專家為顧客土壤分析、果樹健康診斷、土壤改良、整枝修剪、病蟲害防治、施肥設計等；以達良果多收，連年結果而得最高的經營利益。

宏揚肥料工廠 台中縣東勢鎮豐勢路294號 電話：531