

——二期糊仔甘蔗糊植後：—— 稻蔗共生期如何管理？

宏 智

甘蔗常與水稻輪作，尤其糊仔甘蔗栽培容易，現將糊仔甘蔗糊植後稻蔗共生期的管理要點，提出以供參考。

(1) 稻田灌溉：甘蔗糊植後，稻田不得開水，應採取走水灌溉，約五—六日灌溉一次，以免蔗苗浸澇。

(2) 野鼠防治：為防止野鼠盜食芽筍，甘蔗糊植後，應即以殺鼠靈毒餌毒殺野鼠，次數不限，直至野鼠滅跡為止。

(3) 第一次補植及點肥：甘蔗糊植後半個月作第一次補植工作，用雙芽苗補植，凡不發芽或發芽不健全的均須補植，而後隨即每公頃硫酸銨八十公斤，實施第一次點肥工作。肥料必須點於蔗苗下方，離幼蔗基部二十寸左右處，以誘導蔗根向下伸展，及免除幼蔗受到肥傷。

(4) 紫螟蟲防治：第一次在稻穗呈綠豆色時，必須以三百至四百倍「安特靈」稀釋液每分地噴八桶，以防治紫螟蟲。

噴藥時應注意噴射水稻中下部，增加藥效。

第二次在水稻收割後，迅速將稻草搬出並遠離稻田，隨即再以三百—四百倍安特靈稀釋液，每分地五桶全面噴射蔗園（包括幼蔗、稻葉頭及田埂雜草）。

(5) 押稻：為使幼蔗充分接受日光，促進發育及分蘗，於水稻黃熟期必須施行押稻，押稻愈徹底，幼蔗愈粗壯，分蘗產生愈早，但不可將稻桿押斷，以免影響水稻生育，尤其是在颱風侵襲後，水稻倒伏嚴重，押稻工作更加重要。

(6) 第二次補植及點肥：在押稻後，應徹底巡視蔗園，如仍發現缺株或不健全者，應以分芽苗實施第二次補植（葉片必須切除以利成活），而後隨即以每公頃硫酸銨二〇公斤實施第二次點肥工作，方法與第一次相同。

*

*

荷蘭仔公牛是好肉牛！

王正宏

荷蘭仔公牛增重快，屠宰率高，肉質好，是目前世界各國發展肉牛事業很重要的牛種之一。

本省利用尚未普遍

台灣目前有荷蘭乳牛七、八千頭，分布全省，每年估計可生產仔公牛二、〇〇〇頭。目前除高雄牧場公司，有能力把所有自產的仔公牛年約三、四

百頭全數撫育、肥育成「乳牛牛肉」外，尚有台北、竹北、竹南、南投等少數牧場亦已開始收購試養，但收購數目均不到四、五十頭。

在政府輔導計畫下開始收購仔公牛的地區，只有苗栗縣卓蘭鎮農會屬下的景山區十二戶山坡地農家，約可收購一〇〇—一四〇頭。因此每年二、〇〇〇頭的仔公牛中，估計尚有一、〇〇〇頭以上未

被利用。

現政府已訂定長期乳業發展計畫，因此乳牛仔公牛將可不斷供應肉牛飼養戶的需要。

酪農兼養不經濟

乳牛仔公牛並非人人都能養，也不是養了就能賺錢。因為撫養仔公牛要有撫育小牛的技術、能力、經驗，同時也要有相當的場地、勞力及自己生產的經濟優良牧草來配合，才能順利獲取合理的利潤。

酪農友雖然有很多撫育小牛的經驗，但以目前有限的場地、勞力及牧草來飼養乳牛仔公牛並不經濟，還是全力從事牛乳生產，把多餘的場地、勞力和牧草飼料，用以多養幾頭泌乳牛，而把所生產的



甘蔗生長情形（廖清振）