

鴨的繁殖法

唐清岑

慎選種鴨：應向有信用的孵鴨場購進優良種小鴨，才能育成產卵率高、生長快且可節省飼料、增加利潤的鴨羣。

淘汰不良鴨子：留種的鴨羣不論公鴨或母鴨，都應於八周齡時選擇一次，將缺乏活力、體格矮小及性情不良的鴨子淘汰。十六周時再選擇一次，到六月齡時再作最後一次的選擇，如此即可以一隻正番公鴨配四隻正番母鴨繁殖純種的正番子鴨。或以一隻公菜鴨配十五至二十隻母菜鴨繁殖純種的子菜鴨。也可以一隻正番公鴨配十隻母菜鴨繁殖雜種的肉用土番鴨。

通常公鴨的種用年限只半年至一年，母鴨可使用二、三年才淘汰，所以如想自己留種孵化子鴨，均應以活力強、生長良好且產卵能力高的留做種鴨。

清晨傍晚配種：清晨六點及傍晚五、六點時刻，氣溫較低且涼爽，鴨正充滿活力，這時正是鴨子最適合配種的時候。公鴨每日以上下午各行一次配種為限，母鴨則以三、四天交配一次為佳，如此才可以保持良好的受精率。

適當飼養：由種鴨蛋的受精率，可看出鴨子的飼養管理及配種法是否得當。菜鴨羣每百隻母鴨放入六、七隻公鴨讓其自然配種，受精率高達九成以上，而公正番鴨與母菜鴨因兩者

體型差異大，所以需在水中用人工輔助完成配種或用人工受精法補助不足，達到繁殖的目的。

人工受精：可改善受精率一〇—一五%，提高公鴨的使用效率，並可節省飼養公鴨的成本，增加養鴨利潤，是養鴨場提高受精率的最好方法。


(1) 精液的採取：

①按壓法：將雄鴨固定於固定架上，左手按住鴨身，右手按摩腹部約數分鐘後，即見鴨的尾羽翹起，同時雄鴨的生殖突起在泄殖腔內勃發，以右手捏住泄殖腔的周圍，將生殖突起擠出，精液即從其尖端滴下，助手即以備妥的容器盛取精液。

②可使雄鴨與母鴨接近，待雄鴨發生配種行為時，抓住公鴨，以同樣方法將生殖突起擠出，採取精液。

(2) 受精：原精液保存於攝氏五度時，精虫生存時間平均五小時，公鴨採精量平均〇.八CC，每隻母鴨受精量〇.三CC，公鴨每間隔二天採精液一次，母鴨每間隔三天受精一次。如用林格氏液稀釋十—二十倍，受精量每隻〇.三CC。注入部位在母鴨共泄腔的左側。

詳細紀錄：詳細紀錄鴨羣的數目、飼料消耗量、產卵量及孵化等生產收支情形，有了詳細的紀錄，才可了解養鴨的盈虧，檢討得失，做為改進經營的方針，如此養鴨才能成功。



農友牌

臺灣肥料股份有限公司出品

業務接洽處：台北市延平南路

（承銷商名單備索）

電話：二七九六（一線）

電報掛號：五—四—台北

肥効顯著
施用方便

歡迎採用
成份保證

尿素 香蕉肥料

硫酸銹 甘蔗肥料

過磷酸鈣 柑桔肥料

硝酸銹鈣 瓜果肥料

磷酸銹 花卉肥料

蔬菜肥料

電石氣

電極 乙炔黑

電極 糊石膏

液氨 水灰石

液氨 塊石灰

液氨 粉石灰

液氨 氣磷

液氨 氣磷

液氨 酸

主要產品

次要產品