



### 池塘種菱角

〔問〕：（一）菱角何時栽植為宜？

（二）適裁何種土質？怎樣施肥？

（三）每分地栽多少株？若有二、三

天缺水，是否會影響生育？

（四）每分地產量多少？何處有種苗

可買？（台東太麻里鄉泰和村一鄰北

橋六七號黃結迎）

〔答〕：（一）菱角在三月種植比較

適宜。

（二）富有機質的土壤最好，整地與

水稻相同。每十公畝施一千五百至二

千公斤堆肥，過磷酸鈣四五至五十公

斤作基肥。氯化鉀二五至三十公斤，

硫酸銨四五至六十公斤作為追肥，分

三次施用。

（三）水深保持二五至三十公分為宜，

也可利用池塘栽培菱角，栽植密度四

十至五十公分，每分地四千株左右。

三天缺水對於生育並無影響，但以不

缺水為原則。

（四）每分地收穫量，視栽培技術及

病害防治而定，約二至三公頃。

（五）種苗請向高雄大樹鄉九曲村（

電話一二九）楊登發先生接洽種苗。

### 桂花栽半陰處

〔問〕：桂花發育不良，種植數

年僅長四、五尺，所生桂花也很稀疏

〔問〕：（一）矮生木瓜兩分地可種多少株？行株距多少？沙質壤土是否合適？

〔答〕：（一）三十度以下的山坡地，木瓜可

### 木瓜栽培管理

〔問〕：（一）矮生木瓜兩分地可種多少株？行株距多少？沙質壤土是否合適？

〔答〕：（一）三十度以下的山坡地，木瓜可

種不同，或者土質不適合的關係？要使桂花木

長大、繁生，應用何種肥料？（台北市懷寧街一八號范愛偉）

〔答〕：本省普通栽培的桂花，即原產於

大陸的金桂，學名是 *Osmanthus fragrans*. Luor. 花淡黃色，有

清香又名木犀。另有白色園藝變種名銀桂，紅花變種名丹桂，本省栽培較少。

〔答〕：（一）在本省栽培桂花與品種無關，而與氣候有密切關係。桂花性喜冷涼，在大陸長江、黃河流域各省，因氣候

適宜，均集中秋末一次開花，所以花多而否。

〔答〕：（一）本省地處亞熱帶，生育不停，花芽隨時形成，隨時開放，所以四季零星開花，花朵顯得較少。又因氣溫高，花的香氣蒸散快速，因而香氣不濃。

〔答〕：（一）在本省栽培桂花因日照過強，葉部時有日燒現象，有碍開花，因此應裁於半蔭處。

〔答〕：（一）夏季注意灌水，並鋤鬆植株周圍堅硬地面，不但可以保持水土，且有益根部呼吸。

〔答〕：（一）肥料宜用腐熟的厩肥或豆餅水等，注意上述各點，桂花生育情形定會良好。（呂淑濤）

否行空中噴水灌溉，會引起水傷？

〔答〕：（一）何時播種與定植？（苗栗大湖鄉栗林村十六鄰四號吳洛沛）

〔答〕：（一）兩分地全面栽植木瓜，若採行距二·五公尺，株距二公尺，可栽四百株；若行株距均為二公尺，則可栽五百株。

〔答〕：（一）栽培木瓜，宜選鬆軟肥沃、土層深厚、富有機質、通氣良好、P H

（酸鹼度）在六至六·五之間的沙質壤土。

〔答〕：（一）坡地宜選向南、東南或西南的緩坡地，避免選用向北及西的坡地。此外，超過二十度以上的陡坡地也不適宜。

〔答〕：（一）低溫乾燥期，宜於七至十天行地面灌溉或空中噴水灌溉一次，不會引起疫病（水傷）的，但高溫期宜避免行空中噴水灌溉，以地面灌溉較為適宜。

〔答〕：（一）本省北部以三至五月播種，五至七月定植最為適宜。

〔答〕：（一）中南部一至二月因氣溫過低，發芽不良，須有保溫防寒設備外，其餘均可播種育苗。

〔答〕：（一）受牛為害最重而呈黃葉現象時，除用細鐵絲鉤殺天牛幼虫以外，須用利刀切除患部及周圍健全部，以多穗十克和石灰二百克，加水調成糊狀塗抹切除部，但切除患部過大時，需用根接。

〔答〕：（一）受天牛為害最重而呈黃葉現象時，除用細鐵絲鉤殺天牛幼虫以外，須用利刀切除患部及周圍健全部，以多穗十克和石灰二百克，加水調成糊狀塗抹切除部，但切除患部過大時，需用根接。

〔答〕：（一）樹苗種植前可先開植穴，植穴內放置多量有機物質，做為基肥的有機物質，通常以完熟的堆肥較好。雞鴨糞均可作為有機物質的來源，但須經過發酵過程。新鮮的有機肥發酵過程

中，易損傷枯木須留意。

〔答〕：（一）樹枯蘭除非有枯葉蟲的為害，否則不必灌毒殺蟲的藥劑。如植株呈黃葉現象而細根有不易脫落的小土塊，可用放大鏡觀察土塊，除去部分根；若呈黑色時，可斷定為有蟲附着。（翁仁祿）

### 柑桔敗根

〔問〕：柑桔敗根，枯黃而死是何原因？何種藥劑可防治？

〔答〕：柑苗未植前，可否先下基肥？

〔答〕：五年生柑桔，是否需要灌施毒殺根線虫的藥劑？（台中縣東勢鄉南平里南片巷五八號許皓清）

〔答〕：柑桔敗根（根腐）現象發生原因為：過於潮濕（滯水時更嚴重）、旱害、毒素病、流膠病、褐腐病、天牛為害或施肥不當等。

〔答〕：園地排水不良的地方，須改善排水系統，乾燥處須有灌水設備或施株下覆蓋。

〔答〕：已患毒素病而呈黃葉的就不易補救。患流膠病及枯腐病的病株，可利用利刀切除患部及周圍健全部，以多穗十克和石灰二百克，加水調成糊狀塗抹切除部，但切除患部過大時，需用根接。

〔答〕：受天牛為害最重而呈黃葉現象時，除用細鐵絲鉤殺天牛幼虫以外，須用利刀切除患部及周圍健全部，以多穗十克和石灰二百克，加水調成糊狀塗抹切除部，但切除患部過大時，需用根接。

〔答〕：（一）柑桔蘭除非有枯葉蟲的為害，否則不必灌毒殺蟲的藥劑。如植株呈黃葉現象而細根有不易脫落的小土塊，可用放大鏡觀察土塊，除去部分根；若呈黑色時，可斷定為有蟲附着。（翁仁祿）

## 借貸房屋租賃 簽約不須見証

台北縣平溪鄉簡信先  
生問：

第一、房屋租賃訂立  
契約，如果沒有經代書或  
見証人簽名蓋章，只是房  
東和房客自行簽約，是不  
是也生效力？

第二、金錢貨物的借貸來往，  
是不是也要中間人的見証、簽章才  
生效力？

警察電台法律顧問張龍文律師  
答覆：

第一、房屋租賃，只須双方當  
事人間互相同意的表  
示，就成立契約，而  
發生債權債務的關係。  
房東和房客既然簽  
訂租約，當然合法有  
效，不需要再經第三  
人的簽名蓋章。

第二、契約的見  
証人，是為了慎重其  
事和容易舉証而設。  
除非極少數的契約，經法律規定，  
必須有第三人的簽字作証的例外，  
通常一般契約，法律並沒有規定，  
必須要有見証人，因此借貸債務契  
約，不需要有見証人。



### 法律問題解答

(2)如果甲女和乙男在訂婚以後  
，乙男才成為殘廢的話，是不是適  
用民法的規定，不必向他方作解除  
婚約的意思表示？

(3)如果甲女和乙男解除婚約，  
把聘金全部退還給乙男，而乙男拒  
收時該怎麼辦？

警察電台法律顧問莫屏藩律師  
答覆：

第一、甲女和乙男訂婚以後，  
發現乙男身體已經殘廢的事，如果  
乙男有意隱瞞甲女，使甲女誤信乙  
男身體健康而訂婚的詐騙行為，那  
麼，乙男不但沒有索

回聘金的權利，甲女  
反而可以依照民法第  
九七八條的規定要求

賠償。

第二、如果甲女  
和乙男在訂婚後，乙  
男才成為殘廢的話，  
就適用民法第九七六  
條第六款的規定，自  
甲女發現的時候起，可以提出解除  
婚約的要求。

第三、甲女願意把乙男訂婚的  
聘禮，原封不動退還給乙  
男，如果乙男拒絕接受的  
話，甲女可以請求鄰里長  
或主管的警察人員予以調  
解。

如果調解仍然無效，  
最後還可以把聘禮提存法  
院，再由法院通知乙男領  
回。

(4)甲女在民國五十九年十月和  
乙男訂婚。甲女在訂婚後，發現乙  
男身體殘廢，甲女不願意和乙男結  
婚，如果要解除和乙男的婚約，聘  
金是不是要加倍償還？

彰化縣福興鄉梁阿珠女士問：

## 牛樟與芳樟

【問】：(1)牛樟的主伐期是多少  
年？

(2)芳樟幾年可以採收？幾年盛產  
？初產期及盛產期每年每公頃純益大  
約有多少？

(3)芳樟幾年可以採收？幾年盛產  
？初產期及盛產期每年每公頃純益大  
約有多少？

(4)如果甲女和乙男在訂婚以後  
，乙男才成為殘廢的話，是不是適  
用民法的規定，不必向他方作解除  
婚約的意思表示？

(5)如果甲女和乙男解除婚約，  
把聘金全部退還給乙男，而乙男拒  
收時該怎麼辦？

警察電台法律顧問莫屏藩律師  
答覆：

最有利？(台東卑南鄉杉原郵政代辦  
所轉劉從殷)

(1)牛樟的伐期最少應為三  
十年，因牛樟的主要用途為雕刻及製  
材，直徑應以三〇公分以上為宜。要  
達到這樣直徑的牛樟造林木，必須三  
十年生以上。

(2)芳樟三年生即可採葉蒸餾，盛  
產期為七、八年生。

(3)芳樟栽植後第三年，每年可採收  
葉量約三萬六千公斤，可蒸餾芳樟油  
約四二〇公斤。每公斤價格以目前八  
十元計算，即年可收三萬四千元，扣  
除約五〇%的採葉及蒸餾等費用，即  
純收入約為一萬七千元，盛產期(七  
八年生)收益可增加一倍。

(4)目前芳樟油的銷路似無多大問題  
，不過價格很不穩定。

(5)主伐期在二十年以內最有利的  
樹種為泡桐、杉木、麻六甲合歡和桂  
竹等。惟選用樹種必須符合立地條件  
，仍以適地適木為首要原則。(李遠  
慶)

【答】：(1)玫瑰扦插繁殖。

(1)土壤——用消過的特製培養  
土，或肥沃的沙質壤土也可以，扦插  
用土不須施用肥料。

(2)時期——春季較好。

(3)土壤——用消過的特製培養  
土，或肥沃的沙質壤土也可以，扦插  
用土不須施用肥料。

(4)植物生長素——可用奇拔靈(Giberellin) 20PPM (PPM 即百萬分之一) 液處理，在各大農藥店有售。

(5)栽培玫瑰花注意事項：  
(1)風土——玫瑰花性喜冷涼乾燥  
及肥沃的壤土，適溫為一八度至二〇  
度，土壤中性或微酸性。

(2)要有充分的日光(不然會徒長  
而不開花)。

(3)栽培地方要通風，可助呼吸及  
蒸散作用。

(4)時常中耕除草。

(5)施肥以腐熟的豆餅水，加水稀  
釋十至二十倍施用(不要與根直接接  
觸)。

(6)病蟲害防治——台灣氣候高溫  
多濕，病蟲害極易發生，所以預防甚  
為重要，因稍微疏忽，病蟲發生後就  
難治療。每月應撒布一、五〇〇倍馬  
拉松稀釋液一次防蟲，五〇〇倍大生  
稀釋液一次防病。(呂淑濤)

### 訂婚前隱瞞身體缺陷 對方得依法解除婚約

市中山路五二六號胡忠甫

〔問〕：(1)玫瑰如何扦插繁殖？  
(2)在栽培上應注意什麼？(桃園

讀者請注意：來信詢問農業  
問題信件，請註明訂戶號碼，附  
回信信封並貼回郵。不同類的問  
題，最好分寫幾張信紙。