

葉，主幹露出，或枝葉不密，以及雙幹或多幹的，都不是好苗。

龍柏生長緩慢，苗木價格以樹齡和高度計算。樹齡越大，植株越高，價格越貴。台北一般交易行情是一台尺高每株約二十元，二台尺高約四十元，十年生一丈二尺高的在五元以上。

(2) 移植

扦插生根後一年，需作第一次移植。移植時期為十一月至一月間。行株距依幼苗發育情形而定，通常以不使兩株枝葉互相密接為原則。如果枝葉過於密接，密接部分易因缺乏日照而枯萎，影響植株美觀。


以後每一一二年移植一次，以避免主根深入土中，土層缺乏細根，從而影響定植時的成活率。

大苗的移植，應在移植前一年剪斷主根，促進新根生長，一年後帶土掘起。護根土的大小，依樹苗大小而定，一般以樹幹基部直徑的三—六倍，作為護根土的半徑，並用草繩束捆，不使崩散。

栽植深度按原種植深度為宜。栽植時連草繩一起覆埋，並充分鎮壓，使園土與護根土密接，不存空隙。強風地區應立支柱，使不致倒伏。

(3) 灌水

龍柏喜潮濕，俗謂「乾松濕柏」



南港胡適墓園中的龍柏

呂福和

。灌水量需依土質和氣候而定，以保持土壤適當濕度為原則。幼苗更需注意灌水，避免因缺水影響生長。大樹苗定植後，應立即充分灌水。


(4) 施肥

龍柏通常很少施肥，但為促進幼苗生長，可施用適量氮肥。

施肥時，應注意不可傷害葉片。肥料以豆餅、尿素，和硫酸銨為主。

苗木定植前，植穴預先施下堆肥或厩肥做基肥，以促進生長。

西瓜怕霜由黃轉綠トマト尻腐病、白粉病、軟腐病、青枯病、炭疽病蔬菜等使用愛農1號能增強養樣生根，更有抗病力之奇效



瓜類白粉病(左圖)



西瓜炭疽病(左圖)



番茄尻腐病(左圖)

姊妹品 愛農1號 防霜·白粉病·軟腐病·請用愛農1號

防止落果 促進肥大
中國唯一植物救星!!

植物調整劑

農林廳登記証字第1568號



金雞牌

只要您肯試用
多一分下藥
多十分收穫

愛農
ARON アロン



柑桔、蘋果、水梨、葡萄、芒果、荔枝、棗仔、枇杷、水蜜桃等。各種果樹及水稻、蔬菜等，噴霧本品能增強各種抗病力，更加發芽、養糧、結實、賦活葉面細胞等特點，黃萎病回復強壯。

不是誇擴 / 只靠事實 /
每次噴霧稀釋2,000~3,000倍

小森化學產業會社 提供處方
得力綜合興業化學工廠 榮譽出品

通訊處：台中縣豐原鎮府前街新生巷23-8號
台北聯絡處：台北市民生西路216號
台北市延平北路四段112號

電話 2867
電話 517570
電話 516772