



# 女豬飼育方法

..... 邱敏霖

「女豬」是指選作種用而未達配種月齡以前正在生長發育時期的新母豬，不包括其他一般肥育作肉豬的女豬。飼養女豬要注重長期的飼育管理技術，使能充分發揮優良的潛在體質而育成健康的母豬。茲將女豬的飼育方法說明如下：

## 公豬隔開飼養

(一) 隔飼：女豬飼養情形與肥育豬完全不同，女豬到達四至五個月齡時（體重約六〇—八〇公斤），應與公豬隔開飼養。隔飼可使女豬獲得安靜舒適的環境，促進生長，增加活力。大規模企業化的飼養，可採用放牧方式，日間放在一起任其採食牧草及自由運動。但一般農家宜用欄飼方式飼養，豬舍的型式無論單頭式或多頭式，均應設有運動場，以便女豬充分運動。

## 避免過肥過瘦

(二) 避免過肥過瘦，保持中等體型：女豬是將來生產健康仔豬的主體，所以發育時期的飼養管理很重要。因此在育成期的飼養，應注意保持健康活潑的中等體型，無論過肥或過瘦，均容易引起繁殖障礙症。

所謂中等體型，從豬體外表觀察是營養良好，健康活潑，體軀修長，四肢粗壯，各部肌肉豐滿。但洋種豬已定有具體的標準，飼養至八個月齡時，約克夏女豬體重為一二〇公斤，體長（頭部兩耳間

女豬飼料給與量

月 齡	5	6	7	8
體 重 (公斤)	70~80	90~100	110~120	130~140
飼 料 量 (公斤/日)	1.8~2.0	2.2~2.5	2.5~2.8	2.8~3.0
粗 蛋 (%)	13~14	13~14	13~14	12~13

，是生長發育時期，但豬是貪食的動物，食飽後就睡，容易肥胖。應根據這種生理習性，在這時期飼料給與要定量，勿過多或過少，可依體重及月齡酌量調節增減。食不過飽，對消化器的保健很有益處，且不會過於肥胖，可保持中等體型。  
飼料品質要良好及新鮮，如酸度過高，發微變質或粗硬的飼料，容易引起中毒、繁殖障礙或胃腸疾病，均不宜利用。  
大粗或太硬的飼料，應加以細切、壓碎、蒸煮或水浸處理後飼餵，可提高消化率一〇—一五%，增進發育與健康。

管理人員對家畜要有愛護心，在飼餵時，要常以手撫摩豬的背部或腹部，使其感覺舒適安靜，可使豬的性情更趨向溫馴，對以後的飼養管理及母性的良好與否，有很大的幫助。

女豬飼料種類及配合量

	蛋 白 量 (%)	配 合 飼 料	配 合 後 粗 蛋 白 (%)
甘 薯 簽	2.5	30	0.75
黃 玉 米	8.5	38	3.23
大 豆 餅 粉	44	12	5.28
上 等 魚 粉	60	3	1.8
脫 脂 米 糠	17	10	1.7
麩 皮	15	5	0.75
食 塩	—	0.5	—
骨 粉	—	1.5	—
合 計	—	100	13.51

- (1) 甘薯簽如未乾者，應增加3.5—4倍。
- (2) 應設水槽，經常供應清潔的用水。
- (3) 放牧不必加青料，欄飼須給青料。

## 要 定 量

## 給 與 飼 料

女豬期間為育成階段，至尾根）為一〇〇公分，胸圍（前肢肘部後面）為九〇至九二公分。藍瑞斯女豬體重為一二〇公斤，體長為一〇〇公分，胸圍為八〇至八五公分。如超過所定標準，即是過肥，未達標準，即是過瘦。

## 適 齡 配 種 多 產 仔 豬

女豬出生後八—九個月齡時，體重約一二〇—一三〇公斤，開始配種生產仔豬，理想的優良母豬，每頭可分晚十二胎，每胎仔豬一〇頭，即生產仔豬一二〇頭，育成率九成，就有仔豬一〇八頭。  
此外縮短母豬受胎間隔而增加分娩次數，例如兩年之內生產五胎，亦為可行的好方法。只要實施早期離乳，並配合良好的飼育管理，就可達到預期的目的。

希望母豬多產，在女豬發育期間，要有良好的飼養管理，使其長成爲完美無缺的母豬，然後於適齡配種，自可達到多產的要求。

## 充 分 運 動 發 育 平 衡

女豬的運動，不可忽略，有充分運動的豬，筋骨發達，四肢強健，體軀發育平衡，才可保持中等的體型。運動場的面積，應比豬舍大三—五倍，場地要乾燥，需有陽光照射，但一般農家的豬舍，多無運動場，縱有亦甚狹小，應予以改善。茲將飼料給與量及飼料種類配合量列表如左：