



葡萄套袋防鳥

(問)：(一)我種的葡萄每年都用報紙袋套上，可是多數被鳥（白頭翁）啄破，雖用空氣槍與鞭炮來驅除也無效，是否有更好的方法來防治？
(二)用報紙做套袋，在光線上是否

較其他的紙差？用什麼做套袋最理想？
？袋的底部是否要封閉？
（三）酸性土壤對葡萄的產量與甜度
是否有影響？應如何改良？（苗栗西
湖鄉上湖村九份一九一號張儂德）
〔答〕：（一）防鳥唯一可行的方法
是套袋，套袋材料有下列三種：

(1) 耐水專用的紙袋，(2) 蚊帳布做成的袋子，(3) 透明塑膠袋裡襯一層普通的薄紙。

(2) 套袋用紙，應選白色透明度良好且能防水者。

(3) 酸性土壤對葡萄的品質是會影響的，可施用善土石灰或一般用的碳酸石灰。一分地約一五〇公斤，分二次施用，十一月施一百公斤，五月施五十公斤。(施明山)

花生施肥噴藥

〔問〕：花生施肥、施藥的種類及數量各如何？（台北市南京東路四段一三三巷六弄二號趙達文）

無子西瓜的種子，因種壳特別厚硬，尤其臍丘部特別肥大堅厚，而胚部發育通常較小，在自然發芽狀態下，吸水困難，且幼芽不易透出種壳。

〔西瓜什麼時候播種？
〔泰國清邁府芳縣第三號箱 T.D. Mah〕

(二)是否可以經過催芽的手續後再行點播？

〔問〕：（）無子西瓜發芽的溫度如何？

無子西瓜

(3) 賽文(每公頃使用一、三〇〇四、五二〇公斤，可防治虫害，每一百公升水，使用藥量二四〇克噴射。
(4) 馬拉松或P.M.(馬拉松及巴拉松混合液)一千一一千倍液，均可防治虫害。(林慶雨)

分混拌，(1) 每公斤種子與賜保根四、六公克混拌，可以防治白絹病菌侵害。

(二) 使用何種農藥，要看當時發生的病害或蟲害情形及種類而定。

(一) 有關花生施肥量，因所栽培土壤的貧肥而異，通常每公頃使用堆肥一萬公斤，硫酸銼一百公斤，過磷酸鈣三百公斤，氯化鉀一二五公斤，對花生增產很有效果。

所以在播種之前，一定需要鉗子輕輕的把臍丘部種壳軋開，或用指甲刀鋸去臍丘部種壳，以助發芽。

水仙不適高溫

(二) 水仙花原產於何處？
(三) 如何栽培？

(四)那裡有種球出售？(台南市博愛路一三七巷一二號陳秀漢)

〔答〕：（一）水仙花原產於中國的
，一般稱爲中國水仙；產於歐洲者，
普通稱西洋水仙。

水仙花喜冷涼氣候，最適宜生長

的氣溫為一五度C至二十度C，它又喜富有機質的黏性壤土。子球在秋季開始栽植，培育一二年後，即有花芽形成，第三年夏季採收母球，然後

把它置於冷涼乾燥的地方儲藏，並用十度C低温處理一個月。

一三日換水一次。水盆放在日照處，
自放入水盆起一個月，即可開花。

周歲宜在放入水盆前做好，將鱗莖的鱗片，自中間部刻下，深度勿傷及花芽。彫刻過的鱗莖，在栽植數年後才能開花。過度刻傷，則不能再開花。

(三)南風吹時，是溫度高的象徵。長時期的高溫，不適宜水仙發育，花芽無法形成。因此南風常吹，水仙不

開花是可能的。

的是台北縣的三益農場，場主爲羅次卿。（台北市四維路四四巷一四號）
特級球每箱爲批發單位，六十年
每箱（五〇個球）六〇〇元，今年夏
秋之間，須早日預定。（呂淑濤）

