

絲瓜經濟栽培

陳英仁

絲瓜是夏季主要蔬菜之一，本省栽培面積約三、八〇〇公頃。成熟果的纖維，強韌光澤，可供內外銷。嫩果採收完畢後，將植株留六〇、九〇公分，母蔓上部剪除，採集絲瓜水，可做化粧品原料。

本省四品種

(1) 米管種：為本省栽培最普遍的品種之一，因花痕部大，又稱大臍種。早生，莖蔓茂盛，果實短，圓筒形，長十五公分，徑十二公分，肉質細柔，粘質，品質極優。

(2) 竹竿種：果實長圓筒形，適宜採收成熟果做纖維用。果長約四〇公分，徑一〇公分，果面平滑綠綠色，有細長的縱綫，嫩果品質較差，但耐濕性強，適種於水圳及池塘邊。

(3) 長筒種：本省各地均有種植，果長介於米管種與竹竿種之間，長約三〇公分，徑一〇公分，莖蔓發育茂盛，品質中等，豐產。

種植高溫地

絲瓜在高溫，富有機質且保水力

良好的微酸性沙質壤土及壤土地生育良好。如栽植於保水力差，缺乏有機質的土地，產量差，果實短小。絲瓜生育期間長，須將速效性肥料與緩效性肥料互相配合施用。播種前每一公畝可預施堆肥一、〇〇〇一、二〇〇〇公斤，過磷酸鈣四五公斤及草木灰六〇〇公斤做基肥，生育後期分三次施追肥，每一公畝施尿素十八公斤，氯化鉀一〇公斤。

直播栽培法

經濟栽培均採用直播，為促進種子的發芽良好，須進行催芽。將種子浸於清水十六小時，移置盛溫沙的淺床木箱中，後將木箱置放堆肥堆內，保持攝氏二五度左右，經二、三天即可開始萌芽。

於種子剛萌芽時須即自堆肥中取出，放置室內六、八小時，使吸收外氣後再播種於本圃，行距二、四公尺，株距一、二公尺。播種後宜用燒土覆蓋，以免受外氣影響而致發芽速度及發芽率受阻。

十二、二月播種者，為減輕季節風為害，須利用稻草於北邊設置遮風屏。並利用陽光照射提高地溫，促進苗株的生長。如遇下雨，畦面宜灌水並將風屏推倒覆蓋苗株，禦寒防霜。如在庭園栽培，則先育苗，利用塑膠布保溫，苗床每三、三平方公尺，施用一五公斤的腐熟堆肥及過磷酸鈣一五〇公克，後整畦作為播種床，播種密度一二×一二公分，採行點播法。下種後覆土，並灌水，用塑膠布做隧道式護苗。本葉二、三葉展開後，宜盡量曝曬陽光，以利苗株的硬化

期待已久 最近進口

- 韭菜、葱、大蒜：薊馬，潛葉蠅(潛心蟲)特效藥。
- 柑桔：潛葉蛾，介殼蟲，紅蜘蛛。
- 水稻：二、三化螟蟲，稻苞蟲，捲葉蟲，浮塵子、飛蟲類。
- 棉花：棉鈴蟲，蚜蟲，紅蜘蛛，金鋼鑽，紅鈴蟲。
- 菸草：青蟲，夜盜蟲，桃蚜。
- 茶樹：擬尺蠖，小白紋毒蛾，蚜蟲，浮塵子。
- 瓜類：潛莖蠅(瓜實蠅)。


IMIDAN[®]

アッパ水和劑



益米靈

水和劑 50%



即日起現貨供應

25瓦鋁鉛袋裝

製造工廠：美國施多福化學公司
代理商：國際技術社股份有限公司

允發農化工廠有限公司 台北市東園街101巷99弄11號 電話：336549
アッパ普及會：光華農化工廠股份有限公司 彰化縣溪湖鎮員鹿路48之8號 電話：溪湖668(蔡武男)