

，育苗期三〇~四〇天，本葉四~五葉時移植本圃。

採用棚架式

直播者於發芽後二星期間拔一次，於發芽後三星期(本葉二~三葉)時中耕除草行第一次追肥。育苗定植者，於定植後一〇天中耕除草，並施第一次追肥。母蔓三〇~三五公分時施用最後一次追肥，畦面並以稻草覆蓋，以免下雨時水滲泥附於葉背，影響生育及病害的發生，並可固定瓜莖的位置。

絲瓜一般均無整枝，但如要提早採收，須於母蔓一〇~一〇二公尺時摘心一次，促進子蔓發生伸長。如發現子蔓伸長不良的宜予疏除，以免生長盛期植株過度茂盛，阻害通風及着果。母蔓長二公尺時架棚誘引上棚，並將子蔓排行四方，以便將來發育茂盛時，不致過於叢集而利透光，使着果及品質良好。

絲瓜雌雄同株異花，雄花早生先開，為數很多，宜作適度剪除，以利嫩果發育。絲瓜是虫媒花，天氣寒冷時，宜行人工授粉。生育期間需水量多，須在早晨或傍晚作適宜的澆水，但應避免澆在葉面上，以減少病菌的侵害機會。

防治病虫害

絲瓜主要病虫害有下列幾種：

(1) 露菌病：降雨頻繁多濕的氣候發生最烈，幼苗本葉展開數葉時就開始發病，結果後仍繼續蔓延。最初在葉表面顯黃色小斑點，而後逐漸擴大而成輪廓明顯的黃褐色多角形病斑，病斑互相愈合，致使全葉枯萎。

防治露菌病在本葉三~四葉展開

時，即噴「錫乃浦」四〇〇倍稀釋液。勸行種子消毒，應用「賜保根」拌種，並行畦面覆蓋及多施鉀肥，也可防治本病。

(2) 白粉病：發生於絲瓜葉、莖、花萼、果實部位，最初表面發生白色粉末，後漸變灰色，同時上面形成黑色小粒點，最後初害葉即變黃而枯落。初期噴二五%「白粉克」可濕性粉劑一、〇〇〇倍稀釋液，並勸行輪作，消毒種子，勿施太多氮肥。

(3) 蚜虫：成虫及幼虫集生於葉背，心葉內側，花梗的穗部等處，被害部分呈縮捲、黃色甚至枯萎。可噴五〇%「馬拉松乳劑」一、五〇〇倍防治。

(4) 瓜實蠅、黃守瓜、椿象等均為害絲瓜，可参照植物保護推廣方法防治。



長筒絲瓜

日本克勞士牌高性能引擎刈草機
輕便！ 省錢！ 省油！ 防震！

男女婦孺均能容易操作，工作効率甚高。

日本岡恒牌高級園藝工具
鋼質最優秀！設計最實用！
其他：大梨鉗、枇杷鉗、高枝切鉗、刈草鉗、根接鉗

採果鉗 生花鉗
剪定鉗 葡萄鉗
剪定鉗 接木刀
芽接刀

請注意！舊型剪定鉗刀刃銜夾鋼線者均為假製品(台灣製)

日本東海牌高壓動力噴霧灌水兩用機

幫浦效率最高！構造堅固實用！
用途：山區果樹園、水山、農場、菜園、禽舍、環境衛生消毒
*台中縣東勢鎮柑桔園、葡萄園使用本牌者佔百分之九十
種類多：TM2・TM3・AP25・AP45・TM45
(原動機有引擎或馬達，任君選擇)

手提式動力噴霧機
性能優越！

日本麻場產業K.K.出品，高級噴霧機用各種零件及噴頭，噴粒精細，擴散，省藥，工作快速。

三孔強力噴槍
五孔噴槍
開關
回轉管接頭
五孔自在噴頭

◎說明書備索◎

◀原裝進口・歡迎選購▶ 台灣總代理：**新高貿易股份有限公司**
台北市峨嵋街68號 電話：334190・336478 郵撥台北市15195號