

土壤乾燥、灌水不便、地勢較高的地方，宜將稻草切成三節，並把稻株割平，然後將短切的稻草覆蓋。在覆蓋稻草前噴射拉草除草劑，效果很顯著，但要注意覆蓋前應把基肥施用完畢。

毛豆雖是豆科作物，能利用根瘤固定空中游離氮素，但生育初期必須施用適當的肥料，促使幼苗迅速發育。

毛豆栽培如在前作充分施用堆肥和化學肥料，毛豆生育期又合理施肥，產量必然可觀。現行一般施肥標準是每公頃硫酸銨二五〇公斤（夏作爲一五〇—二〇〇公斤），過磷酸鈣三百公斤，氯化鉀一百公斤。

幼苗發育至十公分左右時必須間拔，每穴留二株。雜草必須用人工拔除，通常以除草一—二次爲宜。

禾根播種的平常不實施中耕培土。整地播種的一般實施中耕培土二次。

毛豆生育期間常須充分的水分供給，生育才能健全。發芽後一〇—一五天土壤乾燥時，宜適時灌溉一次。開花前後宜再灌溉一次。結莢後如土壤乾燥時，應再行灌溉一次。同時，豆田四周應設置排水溝，以利排水。

噴藥防治才好。在整個生育期必須噴藥四五次。

第一次：幼苗出土後本葉尚未展開前，噴「賽文」一千倍液，防治蚜心蠅和夜盜蟲。

第二次：幼苗出土後十五天，噴「賽文」一千倍液，防治蚜心蠅和夜盜蟲。

第三次：第二次噴藥後十天左右，用「大生七八」或「大生四五」五百倍，與「馬拉松」八百倍，或DDVP一千倍稀釋液混合噴射，防治銹病和蚜蟲等。

第四次：豆花謝落，豆莢開始形成時，用「大生」粉劑三五〇倍，與「馬拉松」八百倍，或「賽文」一千倍稀釋液混合施用，防治夾螟和銹病。



馬鈴薯收成

(洪祖仁)

V P一千倍，與「大生」粉劑三百倍混合施用，防治豆螟和椿象。

## 二個月即可收穫

毛豆通常在播種後六二—六五天即可收穫。用人工先將綠葉摘除後，從基部割斷，去除病蟲害莢，脫落，莢果水分減少時收穫。春、夏季留種困難，所以一年中所需種子應在秋季充分準備。

儲藏種子的容器，可用木桶、瓷缸，或鋁片和鐵皮製造的桶，甚至較厚的塑膠袋亦可。這些容器在使用之前應先清潔和醃乾，塑膠袋並應嚴防鼠咬。容器底層先鋪一層厚約五—八公分的草木灰，再將種子裝入。種子快裝滿時，上層留約十公分的高度，再鋪一層草木灰，然後蓋桶蓋，密封，在冷涼乾燥的屋內儲藏。

## 告訴您最新優良品種，帶給您驚人的栽培利益！

- ①一分地收益超過3萬元的露地洋香瓜新品種「農友銀河」和「農友57號」（栽培容易，品質優美，銷路好，售價高，產量多，內外銷均可。）
- ②產量豐多，品質優美的無子西瓜新品種「農友新奇」
- ③抗病力特強，早生豐產，品質優美之長型大西瓜「農友610號」
- ④抗病豐產，果形果色均優美之番茄新品種「農友一號」和「農友新四號」
- ⑤抗病早生豐產之胡瓜新品種，小瓜用「新市一號」和大瓜用「新市二號」
- ⑥其他優良蔬菜新品種「新星甜椒」「新香辣椒」「農友萬利瓜子瓜」
- ⑦本年度優良種子之生產不多，欲購從速！目錄及栽培說明書備索！



**農友種苗股份有限公司**

高雄市中山二路154號 電話：220867 郵劃：高雄41866號