



荔枝葉枯

施肥有關

〔問〕：我種植數株荔枝，現在約五合尺高，發育正常，但有三分之一至一半乾葉，這是什麼原因？（台南後壁鄉齊寮村五號黃金水）

〔答〕：荔枝葉片頂端及其邊緣乾枯與病害無關，主要原因為葉片過水過甚。一般缺水原因有：(1)施肥過濃。(2)土壤乾燥，風力過強（如海邊沙地種植的荔枝常有此現象）。(3)土壤鹽分過多，也會引起枯葉現象。

補救辦法是多灌水，並用草類覆蓋根際表土，同時要加強土壤排水。

凡施用濃厚有機肥料者，容易引起葉枯現象，特別以肥料施在孔穴或環形溝內者為甚。以後施肥時，請將肥料均勻散布土面即可。（張振山）

梨樹嫁接套袋

不宜過早除去

〔問〕：(一)梨樹在嫁接成活後，接穗長出新芽（開始嫁接時，已用塑膠帶密封）應如何處理？後來把塑膠袋拿掉為什麼會枯死？

(二)梨樹施什麼肥料較好？（台中大雅鄉三和村信和路七號廖伍祿）

〔答〕：(一)嫁接梨的接穗發芽後

，不宜將膠袋及包紙過早除去，致受曝曬、蒸發過甚而枯死。可先將膠袋封口先剪開少許，使新芽自由伸長至一尺後，再行全部除去。

(二)可以氮肥為主，但磷、鉀肥也不宜過分缺少。（李信芳）

中藥天門冬

〔問〕：(一)天門冬如何種植？

(二)何處有天門冬的種子或種苗出售？

(三)收穫後的天門冬，如何加工製成藥材？（高雄市成功二路二號梁均發）

〔答〕：(一)市面上所用的天門冬，為採自野生藥用植物。栽培株行距為二五公分×三〇公分，肥料以基肥為主。土壤以沙質壤土為適，經整鬆後再混合基肥（堆肥、厩肥以及其他腐熟的有機質也可以），然後整平或作畦均可。

生長期中須搭支柱，生長較好。追肥以人糞尿、豆餅水及少量化肥。修剪枝蔓，主要在於增進塊根的肥大。勿使天門冬開花結果，以減少營養分的消耗。

種植適期在三月至四月間。如三月種植，第二年九月以後即可採收，也就是一年半、二年半或三年半，視市價高低而採收，如此較其他作物易於調節與控制。

(二)種苗在屏東縣山地門附近可洽購，該處生產藥材不少。

(三)採收塊根後，洗去泥土，經燙、煮後剝皮曬乾，或以乾燥機乾燥也可以，如此即成藥材。（徐原田）

夫死妻改嫁 仍有繼承權

台北縣板橋鎮丁守祥先生問：

甲男是一個商人，與乙女結婚後，生有兩個女兒。甲男最近病逝，沒有預立遺囑，留下數十萬元的財產和一間店舖。請問：

(一)甲男家中還有父母兄弟，甲男的財產應該由誰繼承？

(二)甲男的兩個女兒是否應該由乙女撫養？

(三)乙女如果在兩個孩子長大以前改嫁，這些遺產應該屬於什麼人所有？

(四)甲男的喪葬費應該怎麼開支？

(五)店舖應如何處理？

(六)甲男在銀行的存款如何領取？

警察電台法律顧問張龍文律師答覆：

第一、甲男的遺產應由他的妻子和所生的兩個女兒共同繼承。

第二、乙女就是改嫁，對繼承甲男的遺產沒有影響，乙女還是有繼承權。

第三、乙女對於甲男所生的孩子，應該由女負責撫養。

第四、甲男死後的喪葬費，可由遺產中給付。

第五、甲男生前經營的店舖，同樣算是遺產，應該由乙女和兩個女兒繼承。

第六、甲男在銀行的存款，應

該由繼承人檢具證明繼承人身分的文件，請求銀行付款。

彰化縣福興鄉林茂長先生問：甲乙兩地相連。甲地在四年前種桔子，田埂上種有防風竹林，沒有留通路，使乙無法通行，因此只好自己開闢一條小路。

現在竹子的枝葉伸長到乙的田內，使乙田每年減產三、四百斤的稻穀。現在乙想把竹梢砍除，甲說這是為了防風造林，因此不肯砍伐。請問甲的行為是不

是應該？如何請求補償損失？

警察電台法律顧問張龍文律師答覆：

第一、甲乙兩地相連，甲田埂上的竹林枝葉伸展到乙田上，致使乙每年少收三、四百斤稻穀。

依照民法第七九七條的規定，土地所有人，遇鄰地竹木的枝根，有超過界線者，可以向竹木所有人，請求於相當的期限內砍除。竹木所有人不在限定時間內砍除時，土地所有人可以砍伐越界的枝根。

乙依照這項規定，通知甲限期砍伐，如果甲不割除，乙可以自行砍掉。

——鄒仲嵐——

竹木枝根越界生長 所有人應依限砍除

法律問題解答

警察廣播電台提供

益歐 401

低魚毒性水田用殺草劑

特點

- ◻殺草力強
- ◻低魚毒性
- ◻使用安全
- ◻安定性高
- ◻使用簡單

除盡雜草，年年豐收



益歐除草劑普及會

シギョウ
 執行商事株式会社 台北出張所内
 SHIGYO CO., LTD. TAIPEI OFFICE
 地址：台北市城中區西寧南路93號
 TEL. 332688-388556 郵遞區第100號

◆說明書備索◆

苦瓜栽培

〔問〕：如何栽培苦瓜？（高雄大寮鄉琉球路一四八號李登源）

〔答〕：(一)苦瓜栽培法有兩種：

(1)匍匐式—須敷蓋草。

(2)架棚式—於瓜蔓伸展三十公分時架立。

〔答〕：(一)苦瓜的主要病虫害如下：

白粉病—宜噴射可利生一千倍液

，繼續二—三次。

瓜實蠅—二五%馬拉松可濕性粉劑與水溶性蛋白質四百倍混合劑，於雌花出現時，每隔兩畦噴一畦誘殺。

蚜虫—宜噴射馬拉松五百倍液或益加津一千倍液。

〔答〕：(二)苦瓜肥料調配如下（每十公畝）

堆肥：二四〇〇—三〇〇〇公斤

〔基肥〕

氮素：一六一—一八公斤

磷酸：八一—一〇公斤

鉀肥：一三一—一五公斤

豬糞尿：一二〇〇—一五〇〇公斤

〔問〕：(一)肉豬自離乳至出售，

飼共施追肥四次，每半個月施用一次。

〔答〕：(二)苦瓜着果好壞，與陽光透射有關。瓜蔓過於茂密時須疏蔓（盡量修剪孫蔓），以利着果。（王進生）

黃豆粉養分高

〔問〕：(一)肉豬自離乳至出售，

因無法供給牧草和甘薯，在飼料中是否要加脫水青飼料？如需要應添多少？

〔答〕：(一)配合肉豬飼料時，用黃豆餅好，還是用黃豆粉（溶劑）好？

〔答〕：(二)三品種小豬有無特徵？（桃園市大柵溪九五號程業）

〔答〕：(三)養肥豬因無法種植青料，可以在混合飼料中加脫水青料，配合比率：前期為（二〇公斤—一五〇公斤）二%，後期（五〇公斤—九〇公斤）三%就够了。

〔答〕：(四)混合飼料中的主要蛋白質，在臺灣均靠黃豆，黃豆粉含蛋白質四四·五%以上，而黃豆餅只含四〇%。黃豆粉的含水量較低，容易儲藏，混於飼料時，飼料不易變質為它的優點，因此應使用黃豆粉。

〔答〕：(五)台灣現在所生產的三品種豬很複雜，無法舉出它的特徵，可以三品種的毛色做為參考。

TB×J—毛色產生黑、棕色的虎斑，體型很像杜洛克，耳朵薄而下垂。

TB×L—毛色可以出現黑、白花斑，體型長，耳朵下垂。

LJ×W—毛色為白，體型長，耳朵小而立。（張聯欣）

讀者請注意：來信詢問農業問題信件，請註明訂戶號碼，附回信信封並貼回郵。不同類的問題，最好分寫幾張信紙。

豐年讀者服務部