

益歐 401

低魚毒性水田用殺草劑

- 特點**
- ◻殺草力強
 - ◻低魚毒性
 - ◻使用安全
 - ◻安定性高
 - ◻使用簡單

除盡雜草，年年豐收



益歐除草劑普及會

シギョウ
 執行商事株式会社 台北出張所内
 SHIGYO CO., LTD. TAIPEI OFFICE
 地址：台北市城中區西寧南路93號
 TEL. 332688-388556 郵遞區第100號

◆說明書備索◆

苦瓜栽培

〔問〕：如何栽培苦瓜？（高雄大寮鄉琉球路一四八號李登源）

〔答〕：(一)苦瓜栽培法有兩種：
 (1)匍匐式—須敷蓋草。
 (2)架棚式—於瓜蔓伸展三十公分時架立。

(三)苦瓜的主要病虫害如下：
 白粉病—宜噴射可利生一千倍液，繼續二—三次。

瓜實蠅—二五%馬拉松可濕性粉劑與水溶性蛋白質四百倍混合劑，於雌花出現時，每隔兩畦噴一畦誘殺。蚜虫—宜噴射馬拉松五百倍液或益加津一千倍液。

(四)苦瓜肥料調配如下（每十公畝）

堆肥：二四〇〇—三〇〇〇公斤
 (基肥)

氮素：一六一—一八公斤
 磷酸：八一—一〇〇公斤
 鉀肥：一三一—一五〇公斤
 豬糞尿：一二〇〇—一五〇〇公

斤
 (二)共施追肥四次，每半個月施用一次。

(三)苦瓜着果好壞，與陽光透射有關。瓜蔓過於茂密時須疏蔓（盡量修剪孫蔓），以利着果。（王進生）

黃豆粉養分高

〔問〕：(一)肉豬自離乳至出售，

因無法供給牧草和甘薯，在飼料中是否要加脫水青飼料？如需要應添多少？

〔答〕：(一)配合肉豬飼料時，用黃豆餅好，還是用黃豆粉（溶劑）好？
 (二)三品種小豬有無特徵？（桃園市大樟溪九五號程業）

〔答〕：養肥豬因無法種植青料，可以在混合飼料中加脫水青料，配合比率：前期為（二〇公斤—五〇公斤）二%，後期（五〇公斤—九〇公斤）三%就夠了。

(二)混合飼料中的主要蛋白質，在台灣均靠黃豆，黃豆粉含蛋白質四四·五%以上，而黃豆餅只含四〇%。黃豆粉的含水分較低，容易儲藏，混於飼料時，飼料不易變質為它的優點，因此應使用黃豆粉。

優點，因此應使用黃豆粉。

(三)台灣現在所生產的三品種豬很複雜，無法舉出它的特徵，可以三品種的毛色做為參考。

TB×J—毛色產生黑、棕色的虎斑，體型很像杜洛克，耳朵薄而下垂。

TB×L—毛色可以出現黑、白花斑，體型長，耳朵下垂。

LJ×W—毛色為白，體型長，耳朵小而立。（張聯欣）

讀者請注意：來信詢問農業問題信件，請註明訂戶號碼，附回信信封並貼回郵。不同類的問題，最好分寫幾張信紙。

豐年讀者服務部