

沙質地、河床、沙礫地的施肥量 (單位: 10公畝/公斤)

肥料種類	基肥	追肥					計
		第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	
堆肥	750		750				1,500
硫酸銨	5	5	10	15	10	15	60
過磷酸鈣	30			15	15		60
氯化鉀	20				5	10	35
施肥時期	種前五天	定植後或五片葉時	五天本葉抽莖時	二尺長尺	初花期	果實大	

病虫害的田間防治，要注意使用農藥的種類、混合和濃度的準確。噴藥時間最好在下午，可減少藥害。不可噴用DDT、BHC，和硫酸銅劑。

防治病虫

四離花之間摘除不良者留下一果。側莖在第二離花開始留果。發現畸形或不良果時，宜盡早摘除。此外，在水田地、沙質壤土地區或雨季時，可敷草於地面。季節風強的沙地和河床沙礫地應該插草，固定瓜蔓，避免傷害幼果。西瓜結果確實以後，如果人力許可的話，最好翻瓜一、二次，可提高品質。

於西瓜植株上。一般病虫害的防治方法如下：

腰折病：前期保持適當濕度和通風，溫度太高時要遮蔭，以資預防。發病時可用八百倍「烏斯普龍」或一千倍「收樂生」乳劑灌注防治。

蔓割病：即敗株或死株。種子消毒、栽培地區施用石灰、合理施肥，並於播種前三天、開花前、開花期、果實生長期，在植株附近灌注「收樂生」或「施美濃」一千倍液。

萎枯病：消毒種子，削去發病部分，用「大生M二十二」粉未塗敷患部防治。

炭疽病：發生在莖、蔓、葉片和果實上面。發病時有橢圓形或近於圓形的凹陷，乾燥時裂開，濕潤時分泌橙紅色粘質物。消毒種子，氮肥勿施過多，發病時用「紋枯」乳劑一千倍或「好速殺」四百倍液噴射。

白粉病：發病時葉片上有白粉狀物，通常下表面比上表面為多。用「可利生」一千倍噴射，兼防紅蜘蛛。

病毒病：即狂株。發病時不要摘心，全株拔除燒掉。徹底防除雜草和蚜虫、守瓜等，避免與其他瓜類、茄科等作物連作或鄰接，預防發病。

紅蜘蛛：乾燥時容易發生。注意灌水，用「開路生」五百倍或「益加津」八百倍液噴射。

潛葉蠅：用五〇%「馬拉松」八百倍液或五〇%「速滅松」一千倍噴射。

蚜虫：用「益加津」或「馬拉松」八百倍噴射。

黃守瓜：在育苗區插立數枝艾草，燒走黃守瓜的成虫，或用五〇%「賽文」五百~一千倍液噴射。

北市獸藥可字第1674號

日本原裝進口

動物用

最廣範複合抗生物質製劑

樂徽素 S-50 注射液

L-10

パンフィード・L-10 PANFEED・L-10

〈キタサマイシン (ロイコマイシン) 飼料添加劑〉

專治：大小豬下痢症、白痢、赤痢、腸炎、肺炎。

樂徽素 (ロイコマイシン) 係日本，北里研究所藤樹博士由同所土壤中分離出來的放線菌 *Streptomyces Kitasatoensis* Hata，經日本最大世界最有名之一的抗生素工廠—「東洋釀造株式會社」利用高度技術豐富經驗，培養出來的世界第一流的最優秀抗生素。

包裝：內服用 100 g, 1 kg, 20 kg, 注射液 20 c.c, 100 c.c.



發賣元：三鷹製藥株式會社



製造元：東洋釀造株式會社

台灣總代理：博際貿易有限公司 台北市24082號信箱 TEL. 776243