

夏天容易發生的猪病

邱敏霖

各位農友：夏天又到了，因高温多雨，蚊蠅又多，當心你們飼養的豬，隨時都會被蚊蠅或其他方式傳播媒介，引起各種疾病。

日常的飼養管理，應隨時注意豬的健康情形，如食慾狀態、呼吸狀況、行走動作、大便顏色等，只要注意觀察，就可判斷豬是健康或是生病了。

皮膚病

發病原因：猪舍不清潔，糞坑堆滿糞尿，不按時清理，蚊蠅多，飼養頭數過多，或缺乏維他命，礦物質微量物不平衡等，都能引起皮膚病。

主要症狀：皮膚病種類有紅疹、濕疹、蕁麻疹、疥癩性皮炎（蚊、蠅、傳染性膿疱性皮炎、疥癬、蟲、毛囊蟲、不全角化症等。

常以身體摩擦牆壁，嚴重者流出黃色膿樣粘液，結痂，豬體消瘦。白色豬最易發生皮膚病，若不治療，食慾不振，營養不良，逐日消瘦，終至死亡。

防治要點：豬舍環境要經常洗刷清潔及消毒，豬體也要保持乾淨。藥劑治療可用亞鉛華或木溜油軟膏塗擦患部，嚴重者注射油質配尼西林或內服金徽素粉，並在飼料中多給抗生素及青葉類。

痢疾

發病原因：痢疾種類很多，本文所講的只是非傳染病毒所引起的下痢或白痢。如早晨或黃昏時氣溫較冷，容易發生此病，營養失調，豬舍環境不良，也會引起下痢。

主要症狀：病豬精神萎靡，站立一角，頭下垂或躺下，無食慾，次日腹瀉似水樣稀薄且有惡臭。病期稍久，日漸虛弱，以至斃死。

防治要點：豬舍地面應趕快消毒，並保持舍內乾燥與溫暖。藥劑治療，可用氫微素或地微素，另給與維他命B，效果很好。

支氣管炎肺炎

發病原因：因氣候變化無常，時晴時雨或飼養管理不當，特別是較大的養豬場發生較多。對養豬經濟上的損失非常大，宜注意防範。

主要症狀：患豬呼吸急促，流鼻水，口粘膜紅腫，咳嗽，發高熱，精神不振，食慾減退，嚴重時全無食慾，身體漸瘦，行走不穩，虛弱死亡。

防治要點：豬舍應全面消毒保持乾淨，大規模養豬，如發現病豬，應立即隔離，消毒及治療。

藥劑治療可用抗生素與磺胺類藥併用。呼吸迫迫時，應加安納加及營養補給劑肌肉注射。重症者要耐心治療，繼續一星期以上就能痊癒。



一、预防注射

(朱義朝)

寄生虫

猪的寄生虫主要为内部寄生虫，如蛔虫、囊尾蚴、鞭虫、肾虫、肠结節虫、肺虫等，其中以染患蛔虫較多，影响猪的生理健康及發育很大。

發病原因：猪舍環境衛生不良，蚊蠅多，遍地虫卵，易爲猪舔食感染。青菜，甘薯莖葉面上附着寄生虫卵，猪食後直接傳染。此外猪舍運動場泥土表面亦有很多寄生虫卵，猪舔食或接觸後亦能感染。其他如污穢水也能感染。

主要症狀：毛色失去光澤，身體矮小。重症者，因寄生蟲吮吸血液，甚至穿過內臟器官，引起管壁破裂出血，排出血便。患豬日漸衰弱終至斃死。或因寄生蟲排出毒素，豬食了也會中毒死亡。

防治要點：豬舍環境經常清掃消毒。豬舍如非水泥地應加翻土，直接曬日光，把寄生蟲殺死。

藥物治療是使用投藥法，目前較有效的藥品爲「比配拉淨」、每公斤體重給予〇・二五—〇・三公克，重症者亦可併用「牛豬安」。經投藥二十四小時後所排出的糞便就有寄生蟲體，應隨時清掃。

日射病熱射病

發病原因：炎熱的氣候，豬舍通風不良，飲水供應不够，均能影响發病。或因炎熱的夏天，長途運輸豬，也會發生。

主要症狀：體溫增高，皮膚發紅，口流泡沫，口張開，呼吸很快。症狀較嚴重時，四肢無力，倒地地面，呼吸更爲促迫，且帶有汽笛樣的聲音，延至末期虛脫死亡。

防治要點：應改善豬舍通風設備或將豬暫時移置蔭涼處所急救，施以冷水噴霧。運輸途中箱內或車頂上應覆蓋樹葉，減少日光或熱氣直接透射，遇有呼吸困難，應潑冷水。

症狀較嚴重者，要用藥劑治療，以肌肉注射強心劑，抑制呼吸困難。靜脈注射生理食塩水，使其盡快恢復健康，必要時亦可肌肉注射消炎針劑。