

● 專題採訪 ●

仙人掌——植物藝術品

· 薛聰賢 ·

仙人掌類莖葉肥厚，可耐乾燥，稱為肉質或多漿植物，需水量極少，栽植容易，壽命也長，盆栽最為理想。同時，不占地方，病蟲害少，因此很受人們喜愛。

仙人掌雖雖然栽培容易，但因本省雨季太長，太多的水分易引起腐爛，所以在屋外栽植，要有遮雨設備。

大量栽培的可用塑膠布搭棚。家庭觀賞的，在屋簷下栽植就可以。如遇豪雨不停，可搬入屋內避雨。

盆栽仙人掌，接受陽光要均勻。如果單方面向着日光，生長就會彎曲，應該不時轉動花盆。事實上，所有盆栽植物都要轉動。

仙人掌四季均可移植，但以三、四月間最為適宜。如春季已有花蕾，移植後仍可開花。大球可在春季移植一次，中小球春秋各一次。小苗移植後，發育成長更為旺盛。

移植前停止澆水三天，待土壤乾燥後細心拔取，不可切裂根部。先除去舊土，切除枯

根、腐根，陰乾二天至一星期左右再行新植。如小苗成長發育良好，不必切根除舊土即可新植。新植定位後放在弱光下，避免陽光直射，經過一、二天後才可澆水。

許多人認為仙人掌是沙漠中的耐旱植物，不需要澆水，那是錯誤的。如果缺水過久，仍然會枯死。

可是仙人掌根細，不易吸水，需長期供應水分。但如果土壤過濕，會使根部腐爛。一般栽培失敗的原因，往往是澆水過多。

適當的澆水以二天一次為標準，如以素燒鉢栽培，以鉢底流出水分為度。

栽培仙人掌，只要排水良好，能保持水分的土壤就可以，腐植土、堆肥、雞糞都是良好的肥料。

仙人掌是多肉植物，嫁接或扦插都極容易。通常採取仙人掌子球，就可以繁殖。不易發生子球的可採用「切斷」或「切心」法，促進發生子球，

而後採取子球移植（請參看本頁下圖）。

例如團扇仙人掌大量繁殖時，可將扁平的團扇仙人掌莖，切成二、三分寬的片狀，經一、二天乾燥後，置於砂土上，約一個月後即發生子前，可供移植。

嫁接方法也很簡單，只要選與砧木組織相似的接穗，嫁接後自易成活。

仙人掌病害有根腐病、日燒、煤病（線虫室）、銹病（寄生紅蜘蛛）、老衰、赤腐等，大都與管理方法、澆水及空氣、陽光有關。

根部如發現有根虱或線虫，拔取捕殺後即更換新土。

彰化田尾鄉打廉村葉福棋，在他的六分餘地的種苗圃裡，栽植了一千三百多種，五萬餘株仙人掌，爭奇鬥勝。開的花有十幾種顏色，更是鮮艷奪目，美不勝收。

葉先生有十幾年的栽培經驗，經過不斷的改良、配種，才得到今天的成績。這裡談到關於仙人掌的知

識及栽培經驗，都是訪問他所得到的材料。（完）

施恩勿望報

一個人，如果是為了得到酬報才幫助別人，這是錯誤的觀念。

有很多的怨憤不平，都是從要求答報而來。真正的慈善

，只在於感到施捨的喜悅，本身就是最好的報答了。期待他人的報恩，或是責人忘恩負義，都可能引起很多的煩惱。

我的父親並不富有，他自己的生活很節儉，却常常幫助比他更困難的人，這在他來說，比什麼都快樂。因此，他平時省吃儉用，却有一種心安理得的富足感覺。（黎明）



