



# 養鴨注意防治疾病

唐清苓

鴨屬水禽，飼養地點多選於河川、池沼等水源充足的地方，或利用泉水，地下水飼養。因此，水質的好壞對鴨隻健康影響很大，若飼養於水流不良的河川、池沼，常於雨季或炎夏時使飼養環境污穢，成為疾病發生之源。

所以疾病防治，首需注意養鴨四周環境的清潔，有了清潔的飼養場所，鴨隻才能順利成長。茲將鴨子常患的疾病介紹於後，供各位農友參考：

## 家禽霍亂：

是由巴斯德桿菌引起的急性接觸性傳染病，是家禽發生最普遍的疾病。若環境不潔，飼養過密，通風不良時即能發生，且傳染很快。養鴨人家應注意按期實施家禽霍亂菌苗預防注射，使用劑量可依藥廠說明書按鴨齡或體重施藥，可得六個月免疫效果。

如不幸感染到時，鴨隻食慾不振，精神沉悶，下痢稀薄如水，呼吸困難昏睡死亡，剖檢時肝臟散發白色死點，十二指腸粘膜炎出血，心臟冠狀溝散發出血點。最好請當地的家畜疾病防治所用血液塗抹，證明巴斯德桿菌確定本病後，立即撲殺深埋傳染病鴨。

症狀輕微者應隔離，用鏈黴素每公斤體重肌肉注射三〇~四〇CC，每六~八小時注射一次，待病鴨體力稍恢復時，應用家禽霍亂菌苗一〇〇CC裝一瓶加入一克裝鏈黴素二瓶混合後，依小鴨一·五CC、中鴨二CC、成鴨五CC肌肉注射，可挽救鴨羣的損失。

但仍以定期實施家禽霍亂菌苗最可靠且安全，農友們切不可疏忽，待發病時再緊急處理，其損失定比菌苗的價格貴出好幾百倍，不可忽視。

## 中毒：

鴨農為節省飼料費隨處放飼鴨羣，或用腐魚飼養，或不慎切噴過農藥的青料給鴨吃，均易使鴨隻中毒。因此，應盡量防止鴨羣誤食農藥或腐敗的飼料，以防鴨羣因中毒而呈現肢體麻痺或神經症狀而死亡。倘若有症狀較輕者，可用維他命K或B<sub>1</sub>注射。

## 球虫病：

幼鴨一月齡前後發生最多，主因是球虫的腸內寄生而發生，病鴨體重減輕，食慾不佳，在高溫多濕的季節易發生，剖檢時腸粘膜炎腫脹，盲腸肥大，防治法應注意舍內墊草的乾燥衛生。一發現鴨糞有新鮮血便時，即應在飼料中加入〇·五%磺胺劑治療，繼續投藥三天並且消毒鴨舍。

如要長期預防，在飼料中填加〇·〇一%磺胺劑較安全。

## 軟脚症：

由於飼料中缺乏維他命D，或鈣磷配合不妥所引起，應注意按鈣一磷一的比例調配為宜，過多或過少均不好。有時外傷、中毒、關節炎、維他命A不足也會發生。因此應檢討軟脚的原因，對症下藥才有效，最好注意飼料的調配，以防偏食而營養失調。

## 啄毛：

飼養過密，通風不良，飼料調配不當均易引起啄毛現象，應改善通風設備及飼養密度。

鴨舍力求冬暖夏涼，飼料蛋白質量和礦物質應平衡，且夏季應有遮蔭設備。

## 病毒性肝炎：

由發病至死亡的過程很快，常常還沒發現症狀就死亡，二周內的幼鴨死亡率約三成，嚴重者高達九成。病鴨離羣不採食，繼而顯神經症狀、頭頸後仰，兩腳步行困難，死亡時兩腳伸直反腳掌。剖檢肝臟，腫大稍帶紅色斑點，脾腎腫大。

本病侵害仔鴨羣，使農友失去飼養的興趣，如遇有突然死亡多隻仔鴨時，應請當地獸醫診斷，確實是本病時，立即全羣實施耐過本病的鴨血清注射，每隻〇·五CC注射在小鴨的腿部肌肉內，以減少損失。

最好實施鴨病毒性肝炎疫苗預防注射，或向免疫過的種鴨場引進仔鴨較安全。

總而言之，預防勝於治療，鴨農應隨時觀察鴨羣的健康情形，由鴨子每天的活動情形、飼料採食量、育成率等，即能了解鴨羣的健康狀態。如遇有病鴨，應立即隔離治療，死亡的鴨應深埋，切勿到處亂丟，以維護公共衛生，並可保持本身鴨羣的安全。

因為疾病的發生，往往由於空氣、水、飼料、物品器具等的傳播，平時做適當的疫苗注射，保持環境衛生，鴨羣即能飼養成功。



養鴨人家 (林吉郎)