

農友經驗



住在雲林縣東勢鄉嘉芳村嘉芳南路六一號的吳清常農友，三年前的農業生產是以水稻甘薯花生為主，但因耕地土壤均屬沙壤土，收成不好，生活無法改善。

於是前往新港、西螺、莿桐一帶參觀研究蔬菜栽培方法，請教菜農的栽培經驗，開始種植甘藍、包心白菜及三冠、瑞寶夏花菜，結果收入遠較水稻、花生及甘薯好得多。今年又種了三甲餘地的夏花菜，日前已有五、六分地開始收成。以下是吳清常農友的栽培經驗。

夏季栽培花菜，首先要選擇耐高溫多濕特早生的品種，育成強健苗，選擇地勢高，排水良好的沙質壤土，酸鹼度（PH）在六·五~七·〇之間者。

為提高品質，避免發生生理病，應注意適當施用硼素和硫酸鎂。如果土壤是酸性，應該施用石灰或者微量元素，使花菜的發育生長順利強健，以確保產量。

因夏季雨量多，育苗較困難，可用PE塑膠隧道式覆蓋，苗床所用的堆肥必需完全腐熟，苗床需多施過磷酸鈣，以減少土壤酸害，促進根羣發育。種子必須疏播，以利育成強健花菜苗。

吳清常農友談：

夏季花菜栽培

文靜

要。石灰施用量每分地約一〇〇~二五〇公斤，依土壤酸鹼度的高低決定施用量，於犁耕前用半量撒布，犁耕後再撒布所剩的一半，然後耙碎攪拌，使土壤上下都有均勻的石灰。

畦寬四台尺，株距一·二台尺~一·五台尺，馬蹄形種植，種植成活後，施用台肥公司複合一號肥料做追肥。

在花菜花芽分化前，植株的發育愈旺盛，愈能生產質地緻密，大型豐滿的優良花蕾。

因此除注意追肥外，土壤須保持不過分乾濕，使根羣發育良好，以利吸收養分，使花蕾發育良好肥大。定植宜淺，畦面中央需稍高，以免積水，畦面敷以稻草，以免影響花菜的發育。

栽培夏季花菜，因高溫多濕，容易發生病虫害，一般常發現的虫害有小菜蛾、白粉蝶、夜盜虫、軟蟬、蚜虫等。

除於整地時撒布「飛布達」防治夜盜虫等地下害虫外，應注意事先的預防，用「萬靈」泡水三、〇〇〇倍，每隔一周~十天噴射一次，至花蕾形成期停止噴藥。

病害有根朽病、露菌病、黑腐病及軟腐病等，可用「新萬生」或「萬力」泡水一、五〇〇倍噴射防治。若能事先噴藥預防比較有效。

為使植株強健，不易感染病虫害，必須注意幾項原則：

- (1) 選擇耐高溫多濕，生長期短的品種。
- (2) 栽培用地須排水良好。
- (3) 除施用硼素、硫酸鎂等微量元素外，葉面亦需噴射微量元素。
- (4) 雨後必須噴藥及施用追肥。

最後吳農友說，他去年種一甲地的花菜，今年增至三甲多地，原因是夏季花菜價格可靠，栽培容易。



內田牌動力割草機 / 動力茶樹修剪機

*用動力割草機割草、割稻、打枝、省錢、省油又輕便，適用於平地山坡等之操作。



榮譽產品：

- ①動力往復式採茶機
 - ②動力迴轉式採茶機
 - ③動力茶樹修剪機
 - ④內田式採茶鉗
 - ⑤茶園迷你除草機
- 茶業界的福音、茶園機械化、一台採茶機可抵10個人的工作量



台灣總代理：

興林有限公司 說明書備索 全省獨家供應
地址：台北市羅斯福路三段八四巷六號 電話：361122

製造廠：日本內田刃物工業株式會社

