

報紙小字為適當。

為了節省管理工作，可設置自動噴霧保濕器和防虫紗窗等。

菇舍建造完成後，北部於十一月中旬，中部十一月下旬，南部十二月初旬，將菌種搬進菇舍，排在菇架上，拔除綿絨，噴洒充分的水。保持舍內濕度九〇%左右，溫度攝氏一五~一八度，約一星期即可採收。

每瓶可採二~三次，鮑魚菇每瓶產量四~五兩，金花菇五~六兩，金針菇六~七兩，批發價均為每公斤新台幣六十元。

一個冬天可以種植兩期，每期更新時，菇舍需用福麻林或其他有效殺菌劑消毒，以預防病虫害。瓶子栽培的產品，品質一致，比段木栽培者脆，適合製罐。

瓶子栽培的利益很高，以五萬瓶規模為例，分析收支如下：

菇舍	八、〇〇〇元
菌種	二五、〇〇〇元

管理工資 一二、〇〇〇元
合計 四五、〇〇〇元

(一)收入：

第一期收入(八~十頓)四八、〇〇〇~五〇、〇〇〇元，扣除開支，尚有三、〇〇〇~五、〇〇〇元利益。

第二期收入仍然是四八、〇〇〇~五〇、〇〇〇元，但是第二期免投資菇舍，而加消毒費五〇〇元，所以開支是三七、五〇〇元，利益有一〇、五〇〇~一二、五〇〇元。

從少估計，第一期和第二期合計的利益是一三、五〇〇元。

投資七二、五〇〇元，在冬天四個月間，得到一三、五〇〇元的利益，經濟價值很高。

如在夏季栽培一季草菇的話，由於菇舍充分利用，所以收益更高。

菇類是營養豐富的一種食品，對於用腦過多、運動不足，或過於肥胖的人，都很適宜。過去本省栽培洋菇和草菇，已經有很好的成就，將來應提倡新菇類，如金花菇等的栽培，增加農民收益，增進國民健康。

——杜柏



上圖這兩種常見的庭院花木，叫什麼名稱？如何區別？如何繁殖？請看本刊下期「農友新知」。林樹之提供照片

北市農藥字第0404號


有勁蔬菜水菓 病害綜合防除劑 金鳥雷彈K

(38%腈硫醃可濕性粉劑)

特長*從育苗期到收穫期，具有全期性病害防治的績效。

- *適用『瓜類、白菜、蕃茄等病害，柑桔潰瘍病』
- 500倍的『均一濃度』水溶液，可適用於上述任何病害。
- *高溫氣候連續噴霧，亦無藥害。

*說明書備索



《原裝進口》



本社：大日本除虫菊株式會社
台灣總代理：新豐行
台北市迪化街一段65號
電話：545627・516702